




وقف - منجانب شمس العلماء اب احمد عبدالعزیز خان بہادر عزیز جنگ  
 و لا تخلص ساکن حیدرآباد و کن و طیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام دام اقبالہ  
 ابن مولوی حاجی محمد نظام الدین مغفور نایطی - مدراسی - بیادگار مجببٹی  
 کوین و کٹوریہ مرحومہ قیصرہ مستند - در ۱۹۰۱ ع  
 (محمد بن کاہج علیڈہ) (نشان سلسلہ) (۶۲)





# علاج الیہام مملکت ہندوستان

مرتبہ ۱۸۸۷ء

بسم

ملک کاغذات دیوی نرانت

گوشت پر لیس الیہام مملکت ہندوستان

۱۸۹۶ء





دیباچہ دوسری دفعہ چھپوانے کتاب کا  
 تھوڑے عرصہ سے خواہش ملنے اس رسالہ کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بعد  
 نظر ثانی دوبارہ چھپوانے کی ضرورت ہوئی اس رسالہ کے پڑھنے  
 سے معلوم ہو گا کہ بہ نسبت پہلے چھپے ہوئے رسالہ کے اکثر تفصیلین  
 تبدیل کی گئیں اور مرض جیٹریوں کا ماما کی بابت میں ایک نئی فصل  
 درج کی گئی +

# فہرست مضمون

صفحہ	فصل	مضمون
۰	۰	دیباچہ
۳	۱	بھیڑ بکری اور موسیوں کے چھوٹے سے لگبائے والی بیماری
۲۲	۲	بیماری جھیک
۳۰	۳	گھڑ اور تنہ کی بیماری
۳۴	۴	پھیپھڑی
۳۸	۵	گھٹیا یا گھٹریوں
۴۲	۶	سوجن حلق
۴۵	۷	بھیڑوں میں ماتا کا نلکار
۴۷	۸	حلق میں اٹک جانا
۵۰	۹	پیٹ کا پھول جانا
۵۲	۱۰	پھول جانا یا اڑ جانا چارہ کا اور جھڑی میں
۵۵	۱۱	کھانے کا رک جانا پیٹ کی اور جھڑی میں
۵۸	۱۲	لال پانی یا کالا پانی یا خون پیٹاب کے بیان میں
۶۲	۱۳	پیٹ کا چلنا
۶۴	۱۴	پیش
۶۶	۱۵	جگر کے کیرے کے بیان میں
۶۸	۱۶	کھانسی میں
۷۰	۱۷	زہر دیا جانا یا کھانا
۷۳	۱۸	نسخہ جات جلاب

# شرح کتاب

ہیں دوشیوں کی خبر داری کہلانی دہلائی کی اچھی طرح سے کچاتی ہو کم بیمار ٹپسے  
ہیں اگر کوئی نماز زیادہ بے انداز یا کم ملتا ہو اکثر بیمار ہو جاتے ہیں سویشی کے مالک اگر  
تہہ نہ ہو تو ان کی خبر رکھیں تو اسب جو کہ سویشی بیماری سے بچ جائے  
جو مریض اسے میں گھسے ہیں اوغین بعضے ایسے ہیں جو کہ چوٹے سے  
اور باقی مالکوں کی نیچہ گیری کھلائی اور پلائی سے پیدا ہو سکتا ہے  
اس میں بہت سی بیماریوں کا سبب مفصل بیان کیا گیا ہو اگر مالک  
خوبی خبر کرے تو وہ بیماریاں ترک سکتی ہیں پس صاف ظاہر ہے کہ اگر بیماری  
دوشیوں میں پھلے تو اس کے مالکوں کا قصور ہے \*

انہی میں گھاس پھال کے جمع کرنے میں جو خشک مالی وایام سیلاب دریا  
یا سمندر یا میں تمام نہ اکر غافل رہتے ہیں نتیجہ ایسی غفلت کا یہ ہوتا ہے  
جہاں نہین ملتا جہاں نوریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں  
کو چرنے کے لیے گھاس لینے ہیں اکثر زہر دار گھاس اور پتی کھنا جاتی ہیں یا سیلاب  
یا نہ کے بعد وہ گھاس جو کہ پانی میں ڈوبی ہوئی تھی کہا کر بیمار ہو جاتے ہیں



یاد لےئے مرتبہ وہ بیماری جو کہ چھوٹے سے لگجاتی ہے اوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں  
اس لیے مالکان مولشی کو چاہیئے کہ ایسے موسم کیواسطے ہمیشہ بہت چارہ  
جمع کر رکھیں تاکہ اونسکے مولشی اچھا چارہ پا کر اور سایہ دار مکان میں آرام سے  
رکھو یا ریلون سے بچیں ۔

ایسے وقت میں مولشی کا تھان پر بند مار ہنا اور دھوپ اور بارش اور رات  
کی ٹھنڈی ہوا سے اونکا بچنا بھی بہت ضرور ہے کیونکہ اونکو بارش میں تکلیف ہوگی  
یا تر زمین میں ٹھنڈے رہنے کے باگرمی میں دہر کی دھوپ سے تھینکے موسم جائزہ  
ٹھنڈی ہوا اور رات کی اوس سے تکلیف اونکے سینے تک تو کیونکہ تندرست  
رہ سکتے ہیں یہ سب صحیبت ہندوستان کے مولشی کبجی کے مارے کو  
ہنسی پڑتی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہندو بھی اچھی طرح حفاظت مولشی  
کی نہیں کرتے کہ مذہب کے رو سے بعض مولشی اونسکے نزدیک پاک ہیں  
اور از رو سے اوس مذہب کے اونس کو گون کو تاکید کی گئی ہے کہ اونس مولشیوں کو  
سپا را و بھت ادب اور عزت کرنا چاہیئے ۔

جانوروں کا تھان ایسا بنانا چاہیئے کہ آس پاس کی زمین سے اونچا ہو اور  
ڈانور سے بچتا ہو اور دھوپ اور منہم کو روک سکے اور دیوار میں رات  
کی ٹھنڈی ہوا دروس سے بچا سکے اور کھڑکیاں انی ہوں کہ بعد رات رخصت  
رہی ۔ کچھ دروازہ میں آمد و رفت جانور کی بلا وقت ہو سکے ہو اکی آمد و رفت کا  
بہت کھانا تازہ ہوا دینا ہے تاکہ اونی رہتا رہتا رخصت ہو سکے ۔

اور پر سے نکلتی رہے تھان کی زمین اور اسکے آس پاس صاف رہی اور پشیاں  
اور گوبر ہمیشہ اونٹن کا بندوبست کیا جاتا ہے مویشی کی بیماری کا یہ بھی ایک سبب ہے  
کہ بوجھ نہ ملنے اسچھے صاف پانی کے وہ خراب اور غلیظ پانی پیتے ہیں ۔

یہ سالہ اس مراد سے نہیں بنایا گیا کہ امین مویشی کی کھلانے پلانے اور  
ہر طرح کی خبر گیری کے طریقے لکھے جا دیں بلکہ یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ جانوروں  
کی بیماری کا خاص سبب و سبب مالکوں کی غفلت ہے ۔

اتنی خوراک کہ ایک گائے دیا ایک بیل کہا کرتے ہیں کہ اس سے بہت تھوڑی  
دوسروں میں مل سکتی ہے اور ہر ایک آدمی جو گائے بیل سے نفع پاتا ہے اس قدر  
خرچ کر سکتا ہے کیونکہ بیل محنت کر کے اور گائے دودھ اور بچہ دیکر اپنی خوراک  
سے زیادہ نفع دیتے ہیں پس جو مالک اپنے مویشی کو ڈبلا بیمار یا مبتلا سے مریض  
و بار کرتا ہے اور نقصان اونٹناتا ہے وہ اپنی سستی و بے پروائی کا آپ قہور و  
اور اس طرح جو میرمی جانور و نہ کرنا ہے اسکی جوابدہی بھی اسے کندھے پر لیتا ہے

### فصل پہلی

اس فصل میں بھیری بکری اور مویشیان کے چھوٹے سے لگے میانوالی  
بجاریوں کے نام جو ہندوستان میں اکثر ہوتی ہیں اور جو تندرست اور آواز و اجاب ہے  
اسکا بیان لکھا جاتا ہے اور ان میں سے سخت مریض یہ ہیں چھک گٹھہ کھچک  
پھپھڑی مٹا بھڑون میں یہ بیماریاں ہندوستان میں اکثر شریک  
ہوتی ہیں اور ہر ایک جگہ دوسرے دوسرے نام سے مشہور ہیں جیسے بھیری

فہرست ناموں کی اس فصل کے آخر میں لکھی ہے چھک سب سے زیادہ سخت اور چھوٹے سے لگ جانوالی بیماری ہے فی سیکڑا پنجاس سے نو سو تک مویشی دھاتے ہیں اور دو دن سے پندرہ دن تک یہ مرض رہتا ہے گھٹیا چار سو کی سیبے لگ جوتھی قسم وہ ہے جو صرف بیٹروں کو ہوتی ہے اور ہندوستان میں یہ بیماری کم ہے اور باقی قسمیں سوائے بہتری کے اور چھوٹے بڑے فیٹیوں کو ہوتی ہیں اس بیماری کی چاروں قسم کا قیام وہ گھٹیا سے زیادہ کم ہے پاکستان کے سالو تریوں میں سے زیادہ ایک ایسا بیماری ہے اور وہ میں چھوٹے سے لگ جانوالی نہیں ہے اور گرم ملکوں میں ہے اور

رہتا ہے جوتھی سے بہت کم بچتے ہیں \*  
 یہ بیماری بھی سخت اور چھوٹے سے لگ جانوالی بیماری سے اگر تدریجاً علاج کیا جائے تو فی سیکڑا ایک یا دو سے زیادہ نقصان نہ ہو دین \*  
 یہ بیماری چھوٹے سے لگ جانوالی بیماری ہے اور ہندوستان میں زیادہ اس وقت سے چھوٹے سے لگ جانوالی بیماری نہیں تصور کرتے کہ اکثر ہندوستان میں ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ مرض بڑھتا ہے اور ہندوستان میں قیام اس کا ایک حصہ ہے تین مہینے ہی اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ زیادہ لگ جوتھی کی سبب میں اور کھڑا ہر جگہ ہندوستان میں ہوتا ہے \*  
 یہ بیماری اکثر مالک مغربی و شمالی اور پنجاب اور سندھ اور بعض مقامات میں ہوتی ہے یہ بیماری ایک جانور سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں

بلکہ اونکا خدمت کرنیوالا اگر تندرست مویشیوں میں جاسے اور بیمار جانور  
جانوروں کا جھوٹا چارہ یا پانی کھلائے جائے تو تندرست جانور کو بھی بیمار ہی بن جائے گا  
جس میں میں بیمار جانور بندھے ہو وہیں ہاں چھوٹ کا اثر آ جاتا ہے  
خاص کر کہ کچھ چھپک میں انگوٹھا کی ٹہنہ پیٹ سے پانی گرتا ہے اور کھڑکچا میں نمونگی  
پانی پینے سے زمین میں ایسا اثر آ جاتا ہے کہ تندرست جانور کو ہاں باندھنی ہو  
بہرہ و غیرہ اور نکلو ہو جاتا ہے اور اگر آدمی خیر و اذہ رہے تو کھیر کے زہر کا اثر وہیں  
بھی ہو کر دیکھ کر ہر پرستار کو حیرت میں ڈالتا ہے اور یہی جو پانی کھلا دیا جائے گا  
بیماری سب بچھوٹے ٹرسے مویشیوں کو خواہ ویسی ہوں خواہ بنگلی ہو جاتی ہے  
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھڑکچا کی بیماری جس گائے کو لگتی ہو اور کھادوہ  
پینے والے انسان کے منہ وغیرہ میں چھاسے لگنے آتے ہیں اس لینان کا  
اپنی حفاظت کرنا جس طرح ممکن ہو لازم ہے چو نکا یہ بیمار جانور یاں ختم ہوا چھپک اور  
کھیر کا اکثر بیکہہ ہندوستان میں موجود ہیں اور جہاں نہیں پڑتے ہاں اونکا ہوا ہوتا  
غیر ممکن نہیں ہے اس لیے پہلے سے منع کو بھی تدبیر کرنا لازم ہے اور جو کب پڑی  
بکری یا آدمی مویشی پالتے ہیں اونکو یہ کرنا واجب ہے

۱۔ جب کوئی مویشی میلہ سے خرید کیا جائے تو اس میں یہ تصور کرنا چاہیے  
کہ کسی مرض چھوٹے سے لاک جانور اسے کا زہر لگا ہو کیونکہ میلہ میں  
جانور ایسی جگہ سے شاید آئے ہوں جہاں بہرہ بیماری ہوئی ہو کیا عجیب ہے  
کہ تندرستوں میں بیمار جانور کی چھوٹ لگ گئی ہو پس ایسے جانور کو علیحدہ کرنا چاہیے

۲۔ جب گبی مولشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا ہو تو راہ میں اور جانور دن سے نہ مٹنے دے بلکہ رات کو سراسے یا اس کے نزدیک بھی نہ رکھیں کیونکہ سراسے اکثر ان مرضوں سے خالی نہیں کیا عجب کہ تھوڑی دیر پہلے ان بیمار پون کے مولشی ہان بندھ چکے ہوں \*۔

گرمی کے موسم میں ٹھنڈے وقت لیجانا مناسب ہی اور چوبیس گھنٹہ کے عرصہ میں دس بارہ میل سے زیادہ نہ لیجاوین اور راہ میں کئی بار پانی پلانا اور اچھا چارہ کھلانا چاہئے۔

۳۔ جب مولشی خرید کیا جاوے تو اپنے گھر کے جانور کے نزدیک نہ بانڈا جائے اور بوقت چرائی اور پانی پینے کے علیحدہ کیئے جاوین اور جب تک ہر ایک بیماری سے بخوبی پاک معلوم نہ ہو اور یہ حال کم سے کم ایک سے تین مہینے تک معلوم ہو گا علیحدہ رکھی جاوین \*۔

(قاعدہ نمبر ۲۰ اور ۲۱ کو دیکھو) تین مہینے تک صبح اور شام جانور کو دیکھنا چاہئے اگر کوئی علامت بیماری کی پائی یا وہی تو فوراً گلہ سے علیحدہ کر دینا چاہئے اور باقی کئی ایک چھوٹے چھوٹے جگہ بنا کر فاصلہ فاصلہ سے رکھے جائیں اور برتین مہینے کے مگر سب تندرست رہیں تو ملا دئے جائیں \*۔

۴۔ جب مولشی ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو لیجاوین تو دیکھتے رہیں کہ کسی ایسے ضلع میں سے جس میں کوئی چھوٹے سے لگ جانواری بیماری موجود ہے گذر ہوا ہو تو اذ کو بہت عرصہ تک علیحدہ رکھنا چاہئے \*۔

(قاعدہ نمبر ۲۰ اور ۲۱ کو دیکھو) \*۔

۳۔ جب کبھی کوئی بیماری چھوٹنے سے لگ جانے والی یا جس کا شک ہو کسی  
بیماری کو ہو جائے تو اس کو تندرست جانوروں میں سے فوراً علیحدہ کر دینا چاہیے  
۴۔ باقی جانوروں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اگر کسی میں علامت خفیف بھی  
کسی بیماری کی پائی جاوے تو بیمار جانوروں میں شامل کر دیں۔

۵۔ تندرست جانوروں کو علیحدہ علیحدہ فاصلہ سے اس طرح رکھنا چاہیے  
کہ بیمار جانور کی ہوا کے رخ پر ہونے والی ہر ایک غول کی توجہ سے پرہیز کرنا چاہیے  
جو بیمار ہوتا جائے بیماروں کے گلہ میں کر دیا جائے اس پر توجہ سے اگر بیماری  
ہوگی تو وہ ایک غول سے زیادہ میں نہ پہنچے پاؤ گی اگرچہ مہینے تک کوئی  
جانور بیمار نہ ہو تو بسکو ملائے میں مضائقہ نہیں۔

۶۔ بیمار جانور کے رہنے کا مکان خوب مضبوطی کا علیحدہ بنانا چاہیے  
اور بیمار جانور اور اس کی خدمت کرنے والا اس احاطہ سے باہر نہیں نکلتے چاہیے  
اور دوسرے آدمی اونکے کہانے پینے کا سامان اور کپڑا اور جانوروں کی لیے  
گھاس پھال وغیرہ نہ بکریں اور اس احاطہ سے گھاس پھال پانی کپڑا  
وغیرہ باہر نہ لایا جائے بلکہ کٹون کی آمد و رفت ہی اس جگہ نہ ہونے پاوی  
کیونکہ وہ بیماری تندرستوں میں لے جا سکتے ہیں۔

۷۔ بیماری کی گھاس کی احاطہ کے اندر جدا ہی جائے اور گڑباز پریشاں  
وغیرہ گڑباز کپڑا کر کاڑ دیا جائے گڑباز پھٹ سے زیادہ گہرا ہو اور بہنے کے بعد  
دو گھنٹہ خالی رہے تب اس کو چھوئے اور چھوئے ہوئے جگہ پر نہ لایا جائے۔

۱۰۔ انتھان اور اوسکے آس پاس کی زمین روز روز خوب جھاڑ کر اور صاف کر کے دھوئی جائی اور بد بو دفع کرنے کے لیے سفوف میڈیکل صاف کیا جائے اور کوئی چیز نیل چونہ یا رکھ یا خشک مٹی صحن اور تھان کی زمین پر بکھیر دینا چاہیے اور دیواروں اور ٹیٹوں کو پانی سے دھو کر ان پر چونہ کی سپرد دینا چاہیے۔  
۱۱۔ بیمار جانوروں کا مکان ہوا دار بنانا چاہیے اور ایک بکھرے مکان کے اندر

روزمرہ دروازہ دکھڑکی بند کر کے گندک کی دھوئی دیکھاوے۔

۱۲۔ سوتاری کی خشک گھاس باہر دروازہ کی ہوا کی طرح پھونک دینا چاہیے۔  
تدبیر ہے خاص اوس موسم میں کہ مکھیاب کثرت سے ہوا میں پھینک دیتی ہے اور  
۱۳۔ بیمار جانوروں کو نہایت صاف رکھنا چاہیے اور چاروں طرف سے تازہ ہوا کی گھاس کھلا دینا اور شہر سے تازہ جانور نہ لانا چاہیے۔  
کیونکہ بکھرے خشک جھاڑو، لٹاؤں، پتوں پر نسبتاً اون جانوروں کے تر

نرم چارے کی آلودگی سے بڑھ کر بہت سخت ہوتی ہے۔

۱۴۔ جب مریضوں میں کوئی مرض چھوڑنے سے لگ جائے تو ابھیست  
کثرت سے ہوتو سب جانوروں کو تین مہینہ تک پھرائی پر نہ دیا جائے۔ لیون  
اور نہ تازہ جانوروں سے ملے۔ دین (قاعدہ نمبر ۲) کو دیکھو)۔  
۱۵۔ بیمار جانور جب اچھا ہو جائے تو احاطہ سے نکلنے کے بعد گند پانی اور  
سب سے خوب تملا یا جائے اور ایک قسم کا تیزاب کہ انگریزی نام اورنگار بالک الیڈ ہے  
اس پر جاسے تو ایک چھٹا لکڑی پانی میں ملا کر نہلاتا چاہیے۔

۱۶۔ جو جانور چمپک یا پھیٹری یا کھڑپٹا یا گٹھیا کی قسم میں مر جاوین  
اونکی لاش گھرے گڑھے میں دفن کرنا چاہئے اور کم سے کم ڈیڑھ گز مٹی ڈالکر  
زمین کے برابر کر دینا چاہئے ۔

۱۷۔ جو جانور ان بیماریوں میں مرے ہوں اونکی کھال کو جابجا چھری  
سے کاٹ کر دفن کر دیں اگر کھال جدا کرنا منظور ہو تو اوسکو نمک یا چونہ یا  
اور کوئی پدیدو دفع کرنیوالی چیز میں ڈالکر صاف رکھنا چاہئے ۔

۱۸۔ جس جگہ بیمار جانور رہا۔ پھہرے ہوں وہاں کی زمین خوب چھلکر  
ایک گڑھے میں ڈال دینا چاہئے اور پھر چھلنے کے زمین کو کھود کر مٹی کو ستلے  
اوپر کر کے نئی مٹی اوپر بچھا دی جائے اور اگر اینٹ یا پتھر کا صحن ہو تو اوسکو  
خوب کھرج کر دھو ڈالنا چاہئے اور چونہ یا کار بالک ایسڈ جواو پر لکھا ہے  
چھڑک دینا چاہئے ۔

۱۹۔ گاڑی یا چمکڑی کی بم یا جوا یا کاٹھی پالان ساز وغیرہ جو بیمار جانور  
خروج میں آیا ہو خوب دھو کر صاف کرنا چاہئے اور پالانکا استرا ومانڈر کچڑ  
لگا کر جلا دینا چاہئے ۔

۴۰۔ چمپک اور گٹھیا اور کھڑپٹا کی علامت چھوت لگنے سے اٹھائیس  
دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اسلئے چھوت لگے ہوئے جانور کو ایک مہینے  
تک میلحدہ رکھنا چاہئے ۔

۴۱۔ پھیٹری کی علامت چھوت لگنے کی دس روز سے تین مہینے یا  
اوس سے بھی زیادہ تک ہر اسلئے تین مہینے تک چھوت لگے ہوئے جانور کو میلحدہ رکھنا چاہئے ۔



واضح ہو کہ بیہوشی اور موشی کی خارش ہی چہرہ سے لگنے والی بیماریوں  
میں ہے مگر اس بیماری سے مرتے نہیں اس لئے علاج میں بھی بیمار چاند نہ کو  
تندرست سے الگ رکھنا چاہئے تاکہ بیمار تندرست ہو یا دیر پا بیماری  
پھیلنے پناوے۔

مولشی یا بیہوشی جسکو کھلی ہو ہرگز تیار و فربہ نہو دینگے۔

نہرست چچک کے ناموں کی جو ہندوستان کے مختلف مقاموں پر مشہور ہیں:

نام	صناع	احاطہ
اسہال	پرتا بکرہ	۱۰۰ دوش
اسنی	+	۱۰۰ دوش
انچلیا	سورت	بیمبئی
اندرکاماتا	+	پنجاب
ٹرا آزار	+	مدراکس
بنا ہماو	+	۱۰۰ دوش
پڑی	لاہور	پنجاب
ٹرا آزار	+	مدراکس
ٹرا سپرہ	چیمہ گانہ	بنگال
ٹرا آزار	میرٹھ	مغربی بنگال
ٹرا آزار	x	۱۰۰ دوش

نام	صنم	احاطہ
بسنتو	+	بنگال خیزی
ہواؤ	+	مدراس
بھل کھنڈیا	ناخ	بھتی
بھوانی	بنارس	مغربی و شمالی
ہول	+	بھتی
پیڈرن	اگرہ	مغربی و شمالی
پیرہ	چھوٹا ناگپور	بنگال
پنچاستوتا	//	//
پنی پنیو	+	مدراس
پنکنا	+	متوسط
پنکی	ستارا	بھتی
پیدا مدسا اگم	+	مدراس
پیرا نگہ	آسام	بنگال
پٹریا نودو	+	مدراس
پسچیا	+	بنگال خیزی
پسنگا	پٹنہ	بنگال
پوکتا	سلطانیور	اودھ
پوکنا	فیض آباد	//

نام	صنلع	احاطہ
پوکناں کی بیماری	پھاڑپور	اودھ
پھوٹیا	+	بھنبی
پسیا	تنگری	"
پیٹ چلیا	+	اودھ
پیٹر	لاہور	پنجاب
شکم	+	مدراں
تھاگرونی	اڈلیہ	بنگال
جکودمبا	سنتال پرگنات	"
جورن	چٹ گانو	"
جہانی	آسام	"
چنیرا	سلطان پور	اودھ
چنکا	روہیل کھنڈ	مغربی بنگال
چنک	میرٹھ	"
چنک	سلطان پور	اودھ
چنک	+	بیت
چنک	لاہور	مدراں
چنک	پاکستان	پاکستان
چنک	پاکستان	پاکستان

نام	صنعت	احاطہ
چھٹیا	کنارہ	بھٹی
دابا	+	پنجاب
ڈاکٹر	پٹنہ	بنگال جنونی
دوداروگ	+	مداس
دو کھینا	+	بنگال جنونی
ڈھیرسی	راج شاہی	مداس
دیہی	الہ آباد	مغربی و شمالی
دیہی کی ادویا	آٹاؤ	اودھ
دیوی	کلاہا	بھٹی
رین	کھیری	اودھ
روم دو	سورت	بھٹی
زخمی	راولپنڈی	پنجاب
سور	شکارپور	بھٹی
سور	+	بنگال جنونی
سور	+	مداس
سور	+	بھٹی
سور	+	پنجاب
سور	+	بنگال جنونی

نام	ضلع	احاطہ
سیال	مٹتان	پنجاب
سیٹلا	سکونج بہار پٹنہ	بنگال
سیر	میرٹھ	مغربی و شمالی
سیلی	میرٹھ	بمبئی
سیر	شکاپور سٹا	"
فوشوہ	+	بنگال جنوبی
فلو کو	+	بہار مان
کو دینو	+	درہاس
گیونا	لکھنؤ	اودھ
گوبھنٹو	چوٹا ناگپور	بنگال جنوبی
گورہ کھنٹ	کامپور	مغربی و شمالی
گورہ کھنٹ	+	بنگال جنوبی
گورہ کھنٹ	+	"
جھوسا	سیٹلا	مہاراشٹر
مانا	+	بنگال جنوبی
مانا مانگا	پٹنہ	بنگال
مانٹھا سوگ	+	بمبئی
مان	کمایون	مغربی و شمالی

احاطه	میلین	نام
پنجاب	امراشیر	ماندن
بیمبلی	+	مانی
مدرسه	+	مرانی
پنجاب	سجرا نواله	مری
بیمبلی	+	کلهه پسنگا
بنگل	آسام	مکودا
"	"	مکودا
پنجاب	مکودا	مکودا
بنگل	آسام	"
"	"	مکودا
بنیم	نارایا	مکودا
پنجاب	لکھیا	مکودا
"	"	مکودا
بنگل	آسام	مکودا
"	+	مکودا
بنیم	مکودا	مکودا
مکودا	مکودا	مکودا
بنگل	مکودا	مکودا

نام	صنعت	احاطہ
منہجی پٹانی	بلکانہ	بمبئی
میسرہ	میرٹھ	مغربی و شمالی
ماہ	حصار	پنجاب
مال	+	ہنگال جنونی
انور و پیرا	تنگری	بمبئی
نوابی	انبالہ	پنجاب
یتیم بیانی	بلکانہ	بمبئی
دا	لاہور	پنجاب
دارسی اچھا وگ	شولاپور	بمبئی
وار	اودھ	اودھ
وبا	ملتان	پنجاب
راسدہ	+	مدرا
وکائی	+	"
مین	میرٹھ	مغربی و شمالی
نیر	لاہور	پنجاب
ہیرسی ہیری	دہر وار	بمبئی
سالی	اسخ	"
پنیا	"	"

نام	ضلع	احاط
ہیرمی بیانی	وہر وار	"
ہیزا	چوٹا ناگپور	بنگال اور
پور	"	سکیم بنگال
لکھنپور کے ہندوستانی نام		
اکراو	میرٹھ	مغربی و شمالی
ایشو	x	بنگال جنوبی
بتان	x	"
بچکا	حصار	پنجاب
بادلا	ڈھاکہ	بنگال جنوبی
بادل کھور	x	"
بیکرا	کمایون	مغربی و شمالی
بکھیر	کونچ بہار	بنگال
بھورا	x	متوسط
بے اجارا	اوتا کمند	مدرا س
بیکرا	+	متوسط
پکا	اگرہ	مغربی و شمالی
پٹوہ	اوریسہ	بنگال



نام	صنلع	احاطه
پیرا	امر تسر	پنجاب
ٹھیکا	+	متر سطل
چھپ چھپیا	بھا گلپور	پنجال
چھپ چھوپیا	کوئچ بھا	"
چھپکا	وٹیکلکندر	متر سطل
چھپکا	آسام	پنجال
چھمت سیا	کتن گنج	پنجال
چھوہاموسیا	بھاگ	پنجال
چھوہا	+	"
چھوہا	آسام	"
روڑہ	بھاگ	مغربی و شمالی
سہ پا کار	آسام	پنجال
سہ پا کار	"	"
سیدہ	میرٹھ	مغربی و شمالی
سارو	بھاگ	پنجاب
کالا جاره	اوٹا کندر	مغربی و شمالی
کانگ	گور کھپور	پنجال جنوبی
کچا	+	"

نام	ضلع	احاطہ
کورگ مورگ	+	پنجاب
کم کہور	+	اودھ
گنگوا	+	+
کنجالا	بہاگلپور	بنگال جنوبی
کھانگ	+	اودھ
کھچا	+	احاطہ شکم
کھوراپیرا	+	بنگال جنوبی
کھورالی	کوچنگ بہار	بنگال
کھورالا	+	بنگال جنوبی
کھوراینا	+	"
کھربکا	اٹاواہ	مغربی و شمالی
کھربکا	آسام	بنگال
کھربٹا	ہمیر پور	مغربی و شمالی
کھورٹا	+	اودھ
کھورجن	سورت	گجرات
کھورکھٹ	ککلا با	"
کھورسندھ	سورت	"
کھورنیمہ	ککلا با	بنگال

امام	ضلع	احاطہ
کھوروا	احمدنگر	بھیتی
کھروالو	پنج محل	بھیتی
کھورئی	دینا چپور	بنگال جنوبی
کھوسٹیا	کمالیون	جنوبی شمالی
کھور	+	بنگال جنوبی
کھورا	+	"
کھری شا	آسام	بھیتی
گوڑچھوٹا	نرسنگم پور	متوسطہ
گور کھور	اودھ	اودھ
لارو	+	پنجاب
لاگ	کلاہا	بھیتی
لال	شولاپور	"
نگاروگا	سورت	"
موا سا	احمد آباد	"
موی بانگ	+	مدرا اس
موکھڑ	+	پنجاب
مونکھی	انبالہ	"
جھارو	+	بھیتی

کشمیر کے چند وستانی تاسم		
نام	سورت	امداد
پاپسا	+	میتھی
چھو پسا	ورد	میتھی
چھپٹری	+	میتھی
دول جنب	+	میتھی
ہریانہ	حصار	پنجاب
کشمیر کے چند وستانی تاسم		
اوردو	سورت	میتھی
اوروئی	بنج محال	میتھی
پالسا	آگرہ	میتھی
تھلو رسی نوڈو	یرتاند	میتھی
چھیا رسی نوڈو	+	میتھی
ست	+	پنجاب
سدا دھرا	+	میتھی
گھورکا	راس بریلی	اوردو
گھروان	+	میتھی
کشمیر	کشمیر	میتھی



سے لگ جانے والی ہے چاہیے کہ جانور ان مبتلا سے اس بیماری کا علاج  
اویسی طرح کریں جیسا چھوٹے سے لگ جانے والی بیماریوں میں کرتے ہیں۔

## فصل دوسری

### چیچک

اس بیماری کو جنگلہ زبان میں بسنتو اور مالک مغربی و شمالی میں کوئی  
یا چیچک اور ممبئی میں ۱۲ یا جچی، اندر مدراس میں پنا کہتے ہیں ہندوستانیوں  
اسکے اور بھی نام ہیں فصل اول کے آخر میں اکثر لکھے گئے ہیں۔

چیچک ایک قسم کا بیمار ہے، چھوٹے سے لگا، ۱۲ یا ۱۳ سے اور سب بیماریاں  
چھوٹے سے لگ جانے والی جو ۱۲ درجہ سے زیادہ شدید ہے، زیادہ سنگی  
خاص ایک قسم کا زہر ہے جو خون میں ملکر تمام جسم پر مخصوصا جو تہی مدہ یعنی آنسو  
اثر کرتا ہے اسلئے کہ اوج میں علامتیں خاص فتور کی التری پائی جاتی ہیں اس  
بیماری کی علامتیں اکثر دو یا تین سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ بظاہر ہوتی  
ہیں اور کبھی چوبیس گھنٹہ کے اندر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ  
انکسویں سے تا ہزار ڈگریاں۔

اس بیماری کا پہلا نشان گری اور تڑپ ہوتا ہے، ۱۲ یا ۱۳ درجہ  
کرنایو ایک، اوزار کے جیکو انگلی میں ٹھہرا کر دیکھ کر ناگن سے ملے  
جو نشان ایسے ہیں کہ چر کوئی انکو پہچان سکے، انکے تین درجہ قرار دیے گئے ہیں  
اول درجہ کے نشان یہ ہیں جانور کا سست ہو جانا کا پینا چڑھنا بدن کا

سخت ہو جانا منہ گرم اور اندر سے سرخ ہو جانا دہانستا کانون کا لٹک جانا  
اکثر پیٹ قبض رہنا گویا فوطا ہوا آنا بہوک کم لگنا پیاس کی زیادتی تمام بدن  
کی رگون خاص کر کے پیٹہ اور کندھا اور پٹھون کی رگون کا کھینچنا پیٹھ کا گول  
ہو جانا چاروں بالوں کا سکڑ لینا جھجکالی آہستہ اور کم کرنا دانت پیسنا جامیان  
لینا ریڑھ میں درد ہو جانا نبض کا تیز ہونا

دوسرے درجہ کے نشان یہ ہیں منہ کان سینک پائو اور دوسرے  
عضو بدن کی گرمی یکساں نہ ہونا یعنی کہی گرم اور کہی سرد ہو جانا پٹنا بہوک  
نہ لگنا جھجکالی موقوف ہو جانا آنسو بہنا ریڑھ کا درد زیادہ ہو جانا و آخر کو  
چانور کا لیٹ جانا اور کو کھ پر سر رکھ لینا بخار کی شدت پیاس کی زیادتی  
ننگے میں دشواری رگون کا زیادہ کھینچنا نبض بے ترتیب اور بہت تیز چلنا ہائے میں  
وقت مسوڑھ اور کھ میں سرخی ہو جانا زبان پر کانٹے پڑ جانا پیٹ نہایت قبض  
ہو جانا گوبر میں آنوا اور خون کا آنا مقام پیشاب و گوبر کی اندرونی سطح کا خشک و  
سرخ ہونا اور نر جانور کی مقعد کا خشک و سرخ ہونا شکم میں قبض شدت سے مڑو ہونا  
جسکی سبب جانور کو بچھنے لگتا ہے اور کہی بیچ اور مقعد کا باہر اولٹ جاتا۔

تیسرے درجے کے نشان آنکھ سے نیل ناک سے پونٹا منہ سے پانی  
بکثرت نکلنا سانس سے بد بو آنا مسوڑھوں اور منہ کے دونوں گوشوں اور  
کانون اور زبان اور ٹھٹھون اور آنکھ کے پیوٹون کا پھل جانا اور اوپر کم  
بیش زرد رنگ کے چھالے پڑ جانا گلے و انتون کا ڈھیللا ہو جانا دست  
جاری ہونا اول سخت آنوا اور خون کی مٹی اور پیدائش کے تیار ہونا اور دھچک چھپے

آفوا۔ خیران۔ ملے ہوئے نکلے ہیں کہی بدن سوچ جاتا ہے طاقت مطلق جاتی  
 ہے۔ پیچیاں کمر نشیت نکلے ہیں دشواری دہانے کا زیادہ ہو جانا کمال سنگ  
 کا زور سب سے بڑا ہو جانا گیا ہیں گاسے کا بچہ نکل پڑتا ہے پرجا فورسٹ  
 جاتا ہے اور ٹٹنے کی طاقت نہیں رہتی کہتا اور سانس مشکل سے لینا اور پھر خون  
 آئیر بدبودار پتلا کو بر خود بخود بے اختیار بہتا ہے نبض معلوم نہیں ہوتی دو  
 دن سے سر بہ درم۔ کہانہ۔ جاتا ہے کہی علاوہ ان نشانات کے کمال خصوصاً  
 ہاٹ، ٹپ، کتیر۔ میر اور لپا۔ وین پروانہ نکل آتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتے  
 جو جانور سوسکے گریا میں جاتا ہوئے ہیں اور ان کے اکثر یہ دانہ نکلتے ہیں ان  
 دانوں کا نکلنا اچھا ہے جب دانہ نکلتے ہیں پیش زیادہ نہیں ہوتی اور  
 اکثر آسمان پر جاتا ہے اور جب دانہ نہیں نکلتے پیش زیادہ ہوتی ہے  
 اور اکثر جانور مر جاتا ہے۔

ہندوستان میں بعض مالکان بولیشی اس بیماری کو جیکہ خیال کرتے  
 ہیں اور انکی رائے درست ہے جب دانہ بدن پر نکل آتے ہیں تو اسکو ماتا کہتے  
 ہیں اور جب معدہ اور انٹریون میں سوجن ہو جاتی ہے اور گوبر میں آفون  
 چیمپٹرے بلازوا آتا ہے تب اندر کی ماتا اسکو کہتے ہیں کہی کوئی جانور اس  
 بیماری میں باؤلا ہو جاتا ہے خاص کر کے ایسی حالت میں جبکہ نشان اس  
 بیماری کے بلند ظاہر ہوتے ہیں اور دائرہ گہرا کر دوڑتا ہے اور ہاتھ پاؤں  
 مارتا ہے آخر یہ دشر ہو کر گڑنا اور مر جاتا ہے۔

جن انسانوں سے یہ مرض پہچانا جاتا ہے یہ ہیں آنکھ تھنوں منہ سے نکال دیا



پانی نکلنا سڑ ہون اور منہ کے اندر گھاؤ ہونا پیش ہونا کسی بدنبردانہ نکلنے اس امر کا  
دہیان رکھنا چاہئے کہ یہ سب نشان جانور میں نہیں پائے جاتے مگر کوئی نہ کوئی انہیں سے ضرور پہچانے  
چوبیس گنٹے سے بارہ یا سولہ دن تک یہ بیماری رہتی ہے لیکن اکثر تین دن  
سے نو دن تک قیام اس مرض کا ہوتا ہے ۛ

چھپک اور نیاریوں میں سے ہے جو مدت مقررہ تک رہتی ہے اور روکنے  
سے نہیں مڑکتی یعنی جب تک زہر مرض کا بدن سے خارج نہ ہو تب تک جانور تندرست  
نہیں ہوتا ہندوستان میں جو علاج اس بیماری کا اکثر فائدہ مند ہوتا ہے اس کا سبب  
یہ ہے کہ اس ملک میں یہ بیماری کمتر ہوتی ہے اور اس طرح کی سخت نہیں ہوتی چھپن  
سب قسم کے جانور اس مرض میں یک بیک گرفتار ہو جاوے گا کہ فرنگستان میں  
یہ بیماری اکثر سخت ہوتی ہے اور یک بیک سب قسم کے جانور اس مرض میں مبتلا  
ہو جاتے ہیں اسلئے ان ملکوں میں اس کا علاج کم کار گر ہوتا ہے دانہ کا نکلنا اس  
بیماری میں بہت اچھا ہے اور اکثر جس قدر دانہ زیادہ ہون اور سیدر جانور کی صحت  
کی امید ہے والوں کا نہ نکلنا اور پیش کا زیادہ ہونا خراب ہے اور اکثر جانور مر جاتا  
ہے اسکے علاج میں دو باتوں کا خیال کرنا ضرور ہے اول یہ کہ ایسی تدبیر کریں جس سے  
زہر اس مرض کا جو بدن میں اتر کر نہ لگیا ہے کسی نہ کسی طرح خارج ہو جائے دوسرے  
یہ کہ جانور کی حفاظت اور خبر داری کی جائے اور مناسب خوراک اور سکون دیا جائے تاکہ  
مناطق قحطی نہ ہونے پاوے ۔

پہلے درجہ میں رفع قبض کے لئے نکلیں جلاب دینا چاہئے مثلاً گمانیکا نمک  
یا ایک قسم کا نمک جسکے انگریزی میں اسم سالٹ کہتے ہیں یا جوڑا نمک ۔ سیڑ

چٹانک تک ایک یا دو دفعہ کر کے دینا چاہئے جب تک رفع قبض نہ ہو و سے  
 سوا سے اسکے پچکاری گرم پانی اور تیل کی دن میں دو یا تین مرتبہ دینا چاہئے  
 تیز جلاب کا دینا جس سے کمزوری ہو جائے اچانہیں اور مدہم جلاب اس غرض  
 سے دینا چاہئے کہ زہر بدن سے خارج ہوتا رہے لیکن دست زیادہ نہ ہوں  
 ورنہ کمزوری کا اندیشہ ہے اگر دست آٹو اور نون کے ساتھ چوبکس گھنٹہ سے  
 زیادہ تک آتے رہیں تو نسخہ نمبر ۴۴ دینا چاہئے یا نسخہ مندرجہ ذیل پلاوین  
 کا فور شورہ و ہتورہ کا بیج چراتہ ہندوستانی تھرب یہ نسخہ اس وقت  
 دینا چاہئے جب بیماری کا پہلا درجہ ہو اور دوسرے درجہ کی حالت میں  
 جب چوبیس گھنٹہ سے زیادہ عمدہ تنگ دست آتے رہیں تو نو ماشہ مازو کا  
 باریک سفوف دو اندر جہ بالامین ملا دیا جائے اور ہر بار گھنٹہ بعد دیا جائے  
 جب تک دست بند نہ ہوں ۴

خوراک چانول اور کھلی کا دیا خوب گاڑ پکا کر کھلانا چاہئے جب جانور کو  
 دست زیادہ ہوتا ہے اکثر پیاس بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور جانور پانی کی طرف  
 دوڑتا ہے اگر اس حالت میں پانی دیا جائے تو دست زیادہ ہو جائیگی اور جانور  
 کمزور ہو کر جلد مر جائیگا پھلے درجہ میں جب تک قبض کی علامت پائی جائے پانی  
 پلانے میں کچھ ہرج نہیں لیکن جب دست زیادہ آنے لگیں تو پانی بالکل دینا نہ  
 چاہئے بلکہ اس کے عوض تھوڑا سا دیا دینا مناسب ہے ۵

جب دست بند ہو جاوین تو دوا کا دینا موقوف کر دینا چاہئے صرف خبرداری  
 خوراک وغیرہ کی کرنی لازم ہے دلہا اور تھوڑی سی ہری گھاس یا لوسرن یا اون

کوئی سبب چار دینا چاہئے اور شوڑا مائیکس ہو اور لیڈ پین ۱۱۱ جی یا ۱۱۱ جی  
 جانور کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جب اس کا جی با سہرہ اور جیٹ لیا کر  
 اس بیماری میں خشک یا سخت دہارہ کسی حالت میں دیا جائے اور اس سے پہلے کہ ہضم  
 نہیں ہو سکا اور بد ہضمی ہو اور کوئی دوسری بیماری اور اس سے پہلے کہ جانور  
 اور اس کی بیماری پر دوبارہ ہو جائے ہے۔

بھیڑ اور بکر بون کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کے جسم میں  
 ان کا جوہر کم لگتی ہے ایک یہ بات اول میں سنہ کہ جوہر ایک اور دوسرے  
 میں پہنچا سکتی ہیں اور خود تندرست رہتی ہیں بشرطیکہ ان کا علاج ہو  
 جو اوپر بیان ہوا ہے اور وہی دوائیاں دینا چاہئے لیکن غداروں اور  
 بڑے بولشیون کے چٹا حصہ ہے۔

نشان بعد موت کے کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں سختی اور دیر تک رہنے  
 بیماری کے ادب منحصر ہے چنانچہ جب سخت اور تیز بیماری سے جانور جلد مر گیا ہو تو  
 مٹہ اور حلق کے اندر وہی سطح خون سے بہ رہے ہوتی اور سو جی تو ہضم ہونے لگتی  
 ہے اور چاروں طرف حلق کے اور نیچے گردن کے خون ملا ہوا پانی رہتا ہے اور  
 نفعیوں میں اور سانس لینے کے نظام اور پیٹ اور انٹریوں کے اندر خون  
 جمع ہو جاتا ہے خاص کر کے چوتھا پیٹ یعنی جی کی اندر وہی سطح بالکل سرخ ہو جاتا  
 ہے اور اس سے دماغ بہہ رہے اور بیگنی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد  
 ہونے لگتی ہے کہ پیٹ میں اور باقی اور انٹریوں میں خون اور دماغ  
 دماغ میں اور گوبر میں گھٹنی لگا رہے اور سرخ رنگ اور دماغ میں دماغی برقی

نرم ہمارے میں سبب جانور جلد نہ مڑا ہو اور بحالت زندگی منہ میں گھاؤ ہو گئے  
ہوں تو ہمارے ہنر کہ نشانات مذکورہ ذیل پائے جائینگے :-

خون جما ہوا اور گھاؤ اور چالاسوٹ ہوں اور منہ کے اندر اور طلق میں :-  
پیوستہ اول یعنی اوچڑی میں خون جما ہوا اور کبھی کسی مقام کی جلی کے نیچے  
جما ہوا خون ہوتا ہے یا گٹھیاں کسٹار رطوبت جمی ہوئی پائی جاتی ہے :-

یعنی پارناکین کم خون جما ہوا اور کبھی کبھی گٹھیاں کسٹار رطوبت جمی  
ہوئی پائی جاتی ہے :-

تیسرے پیوستہ یعنی پٹا پٹا یا پٹا پٹا کی شکلوں میں لمبی لمبی دھاریاں جسے ہونٹے  
خون کی ہوئی ہیں اور تیشے پر خون میں سوراخ ہی پائے جاتے ہیں :-

چوتھے پیوستہ یعنی جھتہ میں اس قدر خون ہوتا ہے کہ اندرونی جلد بہت  
شرخ ہو جاتی ہے اور کہیں کہیں داغ بلیجی اور نہورے رنگ کے ہو جاتے ہیں  
اور نیچے سے دلچ میں آتے تھوڑے تھوڑے جما ہوا خون اور گھاؤ ہوتا ہے اور کسٹار  
رطوبت جمی ہوئی پائی جاتی ہے :-

چوتھے آئین کے بالائی حصہ میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے مگر نیچے کے  
حصہ میں گھارے ہونٹے ہوں اور رطوبت کسٹار جمی ہوئی بھی پائی جاتی ہے :-

اندر سے خن کی دھاریاں ہوتی ہیں اور کسٹار رطوبت جمی ہوئی  
ہوتی ہے یا گٹھیاں کسٹار رطوبت جمی ہوئی ہے اور بکر خون سے ہرا ہوا اور زرد  
جلد میں نشانات ہوتے ہیں :-

چوتھے ہونٹے کے بالائی حصہ اور کھنچے خون سے ہرا ہوا اور کھنچے خون جما ہوا

چہالہ پڑے ہوئے کھچھیر پٹھر سے مین تاج خون اور کم و بیش زرد سے پھولا میوان ل کے  
بستیر اور باہر پر جا ہوا خون اور رتھا مو نہر بھی جا ہوا خون پایا جاتا ہے +  
دماغ میں خون بہا ہوا اور گون مین خون پاؤں ملا ہوا پایا جاتا ہے ۔

چھوٹ سے لگیا نئے والی بیمار یون کی تدبیر میں بڑے موشیوں کے واسطے  
جو فصل اول میں انکی ہین بیٹر اور بکریوں وغیرہ کے لئے بھی یہی تدبیر میں  
اور جیسا بڑے موشیوں میں تندرست کو بیمار سے الگ رکھنا چاہئے ویسے  
ہی انکو بھی اس مرض کے خارج کرنے کے لئے جو قواعد کہ چھوٹ سے لگنے  
والی بیمار یون کی فصل میں لگنے گئے ہیں انکی پابندی واجب ہے +

## فصل تیسری کھڑ اور منہ کی بیماری

یہ بیماری کئی ایک شہر میں کئی ایک نام سے مشہور ہے بنگال میں ایشو  
حاکم مغربی و شمالی پنجاب و بمبئی میں کھڑ یا کھڑ پکا اور ماس میں منہ پانگ  
کہتے ہیں اس بیماری کے اور بھی نام ہیں جو پہلی فصل میں لکھے گئے ہیں +

یہ بیماری اڑ کے لگائے والا بخار ہے جبکہ ساتھ منہ اور پالو اور باکہ

پر پھپھو کہی طرح دانہ نکل آتے ہیں کبھی پہلے منہ میں کبھی پہلے پانوں میں +

یہ بیماری موشی بیٹر بکری سور مرغی اور کبھی آدمیوں کو بھی بیمار گائے

کا دودھ پینے سے ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں سب جگہ تھوڑی بہت یہ

بیماری ہمیشہ پائی جاتی ہے اور جانوروں کو اپنی زندگی میں کئی ایک دفعہ

ہوتی ہے +

پہلے بدن میں تھوڑی ہوتی ہے یعنی جانور کا پتہ نہیں پر سب سے پہلے  
اور منہ اور سینگ اور بدن گرم ہو جاتا ہے اور جانور بار بار ہونٹ چاٹتا ہے  
اور تھوک لٹکا رہا منہ سے بہتی ہے اور دانہ مثل سپولہ کے ہم کے پی کے برابر  
منہ اور پاؤں میں ہو جاتا ہے پاؤں اور گال کی باکھ میں ہو جاتا ہے تین یہ دانہ  
ناک کے اندر بھی نکل آتے ہیں اٹھارہ یا بتیں گنٹھ کے اندر ٹوکر ٹرخ ٹرخ  
داغ معلوم دیتا ہے یہ داغ یا تو جلد میں اچھا ہو جاتا ہے ورنہ گھما ہو جاتا ہے یہ  
دانہ منہ کے اندر اکثر جیبہ پر زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی سوڑے ہونے لگتا اور  
گال کے اندر ہو جاتے ہیں پاؤں میں اور جگہ بہان چڑھ بد نکاسم سے ملا ہے اور  
کبھی گھائی میں نکلے ہیں جانور منہ کے زخم اور سبب کی وجہ سے کہا نہیں سکتا  
اور چلنے میں لگڑاتا ہے ایسی حالت میں اگر اوس سے محنت لیجاوے تو پیر  
پہو (کرکڑ) گر جاتا ہے اور کبھی پھوڑے بڑے بڑے پاؤں میں نکل آتے ہیں  
گال کے کی باکھ پر جب یہ دانہ نکلے ہیں تو وہ بھی سوچ جاتا ہے اور درد ہو جاتا  
ہے بیمار کا سہ کا دودھ پینے سے بچ کو بھی یہی بیماری ہو جاتی ہے دودھاری  
گائے اور سبب بیماری میں اگر دو ہی جاوے تو دودھ پینے والا کہہ سکتا ہوگا

اور اوپر پھوپھ پڑے رہتے ہیں اگر وہ گاسے نہ دے رہی ہو تو اسے  
پھول جانتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں +

بیمار گاسے دوہنے کے بعد اگر دوہنے والا بکیرا سمجھو تو اسے بکیرا سمجھو

گاسے کو دوہے تو اس گاسے کو بھی وہی بیماری ہو جائیگی +

بھیر کو بھی یہی نشان بیماری کا ہے جو کہ گاسے کو ہوتا ہے بھیر کو بھی یہی نشان

تکلیف ہو کر جلد بلی ہو جاتی ہیں سور کو اس بیماری میں پانچوں اعضا مر جاتے ہیں  
ہوتا ہے اور جلتا ہے اور اکثر ستم گر جاتے ہیں سور کو بکیرا سمجھو اور ہمارے  
یہ بیماری خود بخود پیدا ہوتی ہے +

اس بیماری اور چھیک کی بیماری کی یہ پہچان ہے چھیک کی بیماری میں  
دست کا ہونا ضرور ہے اور پانچ پر دانہ نہیں نکلتے اس بیماری میں ہیزا ہوتا ہے کچھ  
نہیں آتے اور دانہ پانچ میں نکلتے ہیں ممکن ہے کہ ایک جانور کو ایک ہی وقت پر  
چھیک اور کھڑک دو تو ہو جائیں مگر ایسا کم ہوتا ہے +

بیمار مولشی کی اگر خبر داری کیجاوے تو تین چار دن میں بخار جاتا رہے

اور دس پندرہ دن میں جانور اچھا ہو جاوے مگر خیر و زکینہ ہر ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے  
اگر خبر نہ لیجاوے یا بیماری میں کام لیا جاوے تو بخار تیرا در بھوک کم نہ جاتی  
ہے اور کھڑکھون کے بڑے ہونے سے گرجا رہی ہیں اور بانو میں نرم ہوتا ہے  
بڑے بڑے ہڈیوں کے درمیان جانور مر جاتا ہے +

انگلستان میں جہاں بکیرا بڑے ہونے سے مر جاتا ہے وہیں بکیرا بڑے ہونے سے مر جاتا ہے  
سختی اور ٹھہار کے ہیں بکیرا اس ملک کے بکیرا میں کچھ بکیرا مر جاتا ہے اور بکیرا مر جاتا ہے

کسی جانور میں یہ بیماری کم اور کبھی میں زیادہ ہوتی ہے \*  
 انگلستان میں جب یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے تو فیصدی پچاس جانور  
 مرتے ہیں اور ہندوستان میں صرف دو یا تین اگر خبر داری کیجا دے تو ایک  
 بھی نہیں مرنے \*

علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ جانوروں کو صاف رکھیں اور صاف ہوا دار تھا  
 پر باندھیں اور تین دن میں دو تین مرتبہ گرم پانی سے دھو دیں بعد اوسکے نسخہ  
 نمبر ۳ سے دھویا جاوے اور کھائیاں پیر کی اور باکھ اور دیگر مقامات جہاں  
 زخم ہوں میل کو صاف کر کے گرم پانی سے سیکنے جا دیں پھر نسخہ نمبر ۴ زخموں  
 پر لگایا جاوے تاکہ کبھی زخم پر نہ بیٹھے اور کپڑے نہ پڑ جاویں اگر کھیاں باکھ  
 اور ٹنٹھ پر بیٹھتی ہوں تو دو ایک مرتبہ تیل اور کا فور او سپر لگایا جاوے اگر بخار  
 ہووے تو نسخہ نمبر ۵ یا ۶ دن میں دو مرتبہ دیا جاوے \*

خوراک نرم اور ہری گھاس مثل دوپ اور نرم لوسرن یا مہو جب تک کہ  
 نمبر ۴ کے چاول کا مائڈیٹ بھر کر کھلایا جاوے اور دو ایک مرتبہ مائڈیٹ چھانک  
 یا ڈیڑھ چھانک راب اور آدھی چھانک نکال کر دیا جاوے \*

ہندوستان میں جو مویشیوں کو کچھ اور پانی میں باندھتے ہیں اوسکی وجہ  
 یہ ہے کہ زخموں میں کھیاں نہیں بیٹھ سکتیں لیکن اس طریقے سے ریت اور کچھ  
 جلد زخم کے اندر گھسکر سم گوارا دیتی ہے \*

اوسے ان تدبیروں کے اور جو فصل اول میں اڑکر لکھا فی والی بیماری  
 کی بابت لکھی ہیں وہ کھربچا میں استعمال کرنا چاہیے \*



# فصل چوتھی

## پھیپھڑی

اس بیماری کو پنجاب اور سندھ میں پھیپھڑی اور کبڈی میں پاشا یا ذات کہتے ہیں۔  
 میں پھیپھڑی ایک قسم کی آڑ لگیا نیوانی بیماری ہے جس کا اثر خاص پھیپھڑی سے اور اس کی  
 جہلی پہنچتا ہے۔ اور ہر قسم اور ہر عمر کے مویشی کو ہر ملک اور ہر قسم میں یہ آگرتی ہے۔  
 اور اکثر یہ بیک کے طور پر ہوتی ہے اور آثار اس بیماری کے کبھی یہ ہیں اور کبھی جگر  
 کبھی کم اور کبھی زیادہ نما ہر ہوتے ہیں اور یہ بیماری ایک سے چار مہینہ بلکہ اس  
 بھی زیادہ تک رہتی ہے اور چونکہ ایک کی بیمار ہونے سے گاہ کے سبب لپٹی  
 بیمار نہیں ہوتے اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آڑ لگ جانے والی  
 بیماری نہیں ہے۔

یہ بیماری چوت کے سبب سے ہوتی ہے کیونکہ انگلستان میں دیکھا گیا ہے  
 کہ جو جانور ابید پانا ہونے کے گھر میں رہتا ہے اس سے لگنے اور اور مویشیان سے  
 ہمیشہ لگ رہی اور کو یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ جو جانور ایسی جگہ سے جہاں  
 چھوٹ لگنے کا گمان تھا اور کو یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ جو جانور ایسی جگہ سے جہاں  
 لگنے والی بیماری سے جہاں کہیں یہ بیماری نہ ملے وہاں یہ بیماری نہ پھیلے گی۔  
 ثابت ہو جائیگا کہ چوت کے باعث سے ہونی سے یہ بیماری مرض الزردی سے  
 تین مہینہ بلکہ اور عرصہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے یہاں وہ آثار جو آثار یہ بیماری سے  
 واقعہ کار سالو ترمی سینہ ٹھوس کئے اور گاڑ لگا کر سینہ اور اس سے بہتر

دریافت کرتے ہیں نہیں لکھے گئے ہیں لیکن وہ آثار جو مالک سوشی بانی  
دریافت کر سکیں اسی کا ذکر اب کیا جاتا ہے ۔

پہلی علامت یہ ہے کہ جانور ریست پھلے دونوں کے شاید کس قدر زیادہ تندرست  
معلوم ہوتا ہے مگر بعد چند روز کے کانپنے لگتا ہے پھر منہ گرم ہو جاتا ہے اور نبض  
تیز اور تھلے خشک ہو کر کم خشک کہانی ہو جاتی ہے دو دھاری لگتا ہے کا دو دھ  
کم ہو جاتا ہے اور ایک دن کے بعد آثار بخار کے ظاہر ہوتی ہیں وہ آثار یہ ہیں  
منہ کے اندرونی سطح کا سرخ اور گرم ہو جانا سانس لینے میں بدبو آنا کھانسی کی شدت  
اور سانس لینے میں جلدی اور وقت اور نبض تیز ہو جانا یعنی اتنی ضرب سے تلو ضرب  
تک چلنا بعد تھوڑی دیر کے نبض باریک اور کمزور ہو جانا اور جانور جب سانس  
اندر کر لیتا ہے تو منہ اوپر اٹھا کر لیتا ہے اور جب سانس باہر نکالتا ہے تو کہتا ہے  
اور ناک کے سوراخ پھیلا ہوا ہے اور کہڑے ہونے میں کہنیاں گھومائے رہتا ہے  
اور سینے کے بل بیٹھا ہے تاکہ پسینوں کی پھیلنے میں آسانی ہو اور جب ایک ہی طرف  
کی پھیپھڑی میں بیماری ہوتی ہے تو اسی کروٹ لیٹنا یا بیٹھتا ہے تاکہ تندرست  
پھیپھڑی میں ہوا کی آمد و رفت بخوبی دلا وقت ہو کبھی اول سجدہ یعنی اوچھڑی  
میں ہوا بھر جانی کے آثار جبکا بیان فصل نو میں ہے ظاہر ہوتی ہیں آنکھ ناک  
سے رطوبت جاری ہوتی ہے ہاتھ پاؤں سینک جلد ٹھنڈے پڑ جاتی ہیں سانس  
بروز آتی ہے کہانی زیادہ ہو جاتی ہے مگر کہاں سے کہہ دقت جانور  
میں سوجھنا سوجھنا اور سستہ رہنے کہ سانس سکتا جانور دہلا ہو جاتا ہے پسینوں  
سینے میں دھبے دھبے اور سر کے جانور تھوڑا بہت اور تھوڑا بہت

دست جاری ہو جاتے ہیں بعد دور ہو جانے بخار کے بہوک بڑھ جاتی ہے اور بیماری میں بھی جانور خوب کھانا ہے جب بیماری بڑھتی جاتی ہے پھیپھڑے اکٹھا ہو کر وزن دار ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں قوت ہوتی ہے اور خون صاف نہیں ہو سکتا اور جانور ڈبلا ہو جاتا ہے اور آخر کو دم گھٹ کر جاتا ہے جب ایک پھیپھڑے میں بیماری ہو تو اکثر امید ہے کہ ہو جانے کی ہے لیکن کچھ مدت تک جانور ڈبلا رہتا ہے اور اگر دونوں پھیپھڑوں میں ہو تو اندوخت ہو کی بند ہو جاتی ہے اور جانور دم گھٹ کر جاتا ہے۔

اگر یہ بیماری سخت اور تیز ہو تو ایک ہفتہ سے دس دن کے اندر جانور مر جاتا ہے اگر نرم اور کم بیماری ہو تو دو تین مہینہ کبھی چھ مہینہ جانور زندہ رہتا ہے۔ اس بیماری میں دو کام فائدہ کرتی ہے اس لیے انگلستان اور جاپان گوشت کھانے میں خیال نقصان جانور کو نہ کر ڈالتے ہیں ہندو بوجہ مذہب فیج نہیں کرتے اور اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی نہیں تصور کرتے بیمار جانور کو گلے سے ملدہ نہیں کہتے جس باعث سے یہ بیماری پھلتی ہے۔

انگلستان کے رہنے والی بھی سابق میں بہت دن تک اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی ہونے میں شک کرتے تھے کیونکہ اکثر بیمار جانور کے قریب بندھی ہوئے جانور تندرست رہتے اور دور کے بندھے ہوئے مبتلا ہو جاتے تھے دوسرے یہ کہ وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ بعد چھوٹ لگنے کے یہ بیماری تھوڑے عرصے کی بعد ہونی چاہیے برخلاف اس کے یہ بیماری بہت دنوں میں ظاہر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اناراسکے اچھی طرح سے

ظاہر نہیں ہوتے بلکہ یہ بیماری فری ہے لیکن اب اہل یورپ اور آسٹریلیا  
 اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی قرار دیتے ہیں۔  
 شروع بیماری میں جب تک کل آثار ظاہر نہیں ہند و ستان میں بچان  
 اسکی نہیں کیجا سکتی ہے اور اسی وجہ سے اکثر جانور مر جاتے ہیں۔  
 جب کسی جانور کو یہ بیماری ہو تو اس کے کھلاسے پلانی میں خبر داری  
 کرنا ضرور ہے تھان صاف اور اچھی ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست کرنا چاہیئے  
 اگر قبض بہت تیز ہو تو نسخہ نمبر ۱۰ اگر قبض ہو تو نسخہ نمبر ۵ دینا چاہیئے اور جب بخار  
 بالکل دور ہو جاوے تو سفوف نسخہ نمبر ۱۱ چاول کی مانند مین ملا کر دو ایک مرتبہ  
 دن میں کھلایا جاوے اگر سانس لینے میں دقت ہو تو سینہ پر مطابق نسخہ نمبر ۵  
 کے سینکنا چاہیئے اگر قبض ہو تو چٹانک ڈیرہ چٹانک راب اور ایک چٹانک  
 نمک اسی کے دیئے مین ملا کر مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۵ کے دو ایک دفعہ  
 دن میں دیا جاوے اگر جانور کمزور ہو تو ایک چٹانک ہند و ستانی شراب  
 ایک سپردیئے مین ملا کر دو ایک مرتبہ دن میں کھلایا جاوے۔  
 خوراک ہری گھاس اور کوئی نرم چارہ یا چاول یا چھ دیا جاوے اور پانی  
 بقدر پیاس کے پلایا جاوے سٹری یا سوکھی گھاس یا پوال وغیرہ ہرگز نہ دینا چاہیئے۔  
 یاد رہے کہ اس بیماری سے جانور کم بختا ہے اور اگر بچا تو کمزور اور دوما ہمیشہ  
 رہتا ہے پس چاہیئے کہ بیمار مویشی اور اسکی خدمت کرنا اسلئے کو اور  
 تندرست جانوروں سے جدا رکھئے۔ (سرس پانی کو ملاحظہ کیجئے)۔  
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بیماری میں بونا زمرگیا ہوا اسکے چھٹی پھری سے

رطوبت لیکر تندرست جانوروں کے ٹیکا اگر لگایا جاوے تو ہر چھوٹ نہ لگے گی اور بیماری نہایت کم ہوگی لیکن معتبر ساو تریوں سے معادہ ہوا ٹیکا کچھ فیصد تا دینہ کرتا اور بیماری کو باز نہیں رکھتا اور مویشی کو ہمیشہ بیماری سے محفوظ نہیں کر سکتا۔  
بعد میں جانور کے علامت یہ ہے پھیپھڑے کا وزن پندرہ سیر سے ساڑھے سنیٹیس سیر تک ہو جاتا ہے حالانکہ تندرست بیل کا پھیپھڑا اڑھائی باتین سیر سے زیادہ نہیں ہوتا اور کبھی پیپ سے بہا ہوا اور کبھی سخت مغل جگر کے ہوتا ہے اور کسی کسی مقام پسیلیوں سے چپک جاتا ہے۔  
کبھی یہ مرض صرف ایک ہی پھیپھڑے میں ہوتا ہے۔

## فصل پانچون

### گٹھیا یا گٹھڑیوان

اس بیماری کو پنجاب میں گولی یا سوکھ اور بنگالی میں گلا پولابھٹی میں اڈور اور مدراس میں تہالوری نو دو و اضلاع مغربی و شمالی میں گٹھڑیوان کہتے ہیں اور گٹھیا بھی مشہور ہے۔

یہ بیماری خون کی ہے سر و ملکوں میں چھوٹ سے لگنے والی بیماری اسے نہیں قرار دیتے لیکن ہندوستان میں بھی اکثر ایک قسم کی سوجن چڑے کی نیچے خاص کر سکے کو یا اس کے یا پچھلے دہڑ اور کبھی زبان میں یا حلق میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر ہوا بھی ہر جگہ ہے جس کے دباؤ سے چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ مویشی سے یہ بیماری اور جانوروں یا آدمی

کو چھوٹ کے ذریعہ سے ہو جاتی ہے اور انسان میں ایک قسم کے پھڑون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے ۔

سبب اس بیماری کا یہ ہے کہ خراب کمزور ریشہ دار چارہ جو مویشی پہلے کھاتے ہیں اور پھر یکا یک ہری اور عمدہ کھاس چرتے ہیں ان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ خاص کر کے کم عمر جانور کو کیونکہ انہیں نسبت بڑے جانوروں کے خون جلد اور بہت پیدا ہوتا ہے اور یکا یک خراب ہو جانے کی وجہ سے رگہ رگہ سے لگ لگائی ایک جگہ اور نرم مقاموں میں جمع ہو جاتا ہے۔ موسے تازہ جانور کو خاص کر کے جوڑے بن میں بعد جلد موسے ہو جاتے ہیں یا ایسے موسم میں جب رات بہت سرد اور دن بہت گرم ہو سایہ دار مکان میں مویشی نہیں لگے جاتے یہ بیماری ضرور ہوتی ہے ۔

جس جگہ کی زمین بچی ہو اور پانی کا کھاس نہ ہو وہاں بھی یہ بیماری خوارہ خواہ ہوتی ہے ۔ پہلے انگلستان میں جہاں کہ زمین خراب و میلانی تھی اور پانی کا کھاس نہ تھا یہ بیماری بہت ہوتی تھی اب جب سے زمین برابر اور درست ہو گئی بیماری نہیں ہوتی لیکن پورب کے پندرہ سالک میں جہاں یہ سب خرابیاں ابھی تک ہیں وہاں کم مویشی یہ بیماری سے بچنے سے موسم میں ہوتی رہتی ہے اور ہندوستان میں بھی چراگاہ کی خرابی اور میلانی جوڑے سے ہوتی ہے اور یہ ایک جانور کو یہ بیماری ہو گئی تو ضرور اس جگہ کے دوستانہ بہانہ ہے اس مرض میں مبتلا ہو دینے کے صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ بیماری چھوٹ سے لگنے والی ہے بلکہ یہ بھی سبب کہ خراب

چہرہ گاہ میں چہرے کے باعث سے پیدا ہوتی ہے \*  
 اچھا تندرست جانور گھنٹہ دو گھنٹہ میں ایک بیک سست ہو کر اکڑ جاتا ہے  
 اور بالکل ہلنے دوڑنے نہیں سکتا + شوڑی ویر بعد تمام بدن کے چڑے  
 کے نیچے کسی مقام پر خاص کر کے کراگلے یا شچیلے دھڑیا حلق یا زبان میں  
 سو جن آجاتی ہے اور کبھی یہ بیماری مغز میں ہوتی ہے اور کبھی پیٹ یا سینہ  
 کے اندر + چڑے کے دبانے سے ایسی آواز معلوم ہوتی ہے گویا  
 اسکے اندر ہوا بھری ہے یہ ہوا خون کے ٹرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے  
 سر میں جب یہ بیماری ہو تو بیوشی ہوتی ہے اور گلے یا پھیپھڑی میں ہونے سے  
 سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور تلی یا اور کسی مقام پیٹ میں ہونی سے  
 درد پیٹ شدت ہوتا ہے اور اگر غصہ میں + تو وہ مقام جلد بیکار ہو جاتا ہے  
 اور جانور کھارگی چلنے پر سے نہیں سکتا + بیج کی طح کھڑا جاتا ہے + اہل پنجاب  
 اس بیماری کو اسی لئے گولی کے نام سے مشہور کرتے ہیں اور کہتے ہیں  
 گویا اس جانور کو قدرتی گولی لگی سالتی ہے یعنی میں دشواری ہوتی جاتی ہے  
 جانور کہتا ہے بنھ کفر ویر جلد جلد تیرا پیٹ + اور جانور کفر ویر ہو جاتا ہے اور  
 سو جن پڑھ جاتی ہے پھر تیرے گھنٹہ میں مر جاتا ہے \*  
 دو گھنٹہ سے جو بیٹل گھنٹہ تک اکثر دو گھنٹہ سے نو گھنٹہ اس مرض کی سیما  
 اگر سو جن بہت ہو یا سانس لینے میں بہایت دشواری کی وجہ سے پھیپھڑے  
 میں خون جمع ہونا معلوم ہو تو دوا سے کچھ فائدہ نہیں + قبل سو جن ہونیکے  
 نسخہ نمبر ۳۱ یا نمبر ۳۲ آٹھ آٹھ یا دس دس گھنٹہ کے بعد دیا جاوے جب تک

دست جاری نہون اور دو گنڈہ بعد ایک چٹانک دیسی شرب اور آٹھ ماشہ کافور  
 پاؤسیر دیے میں خوب ملا کر دیا جاوے اور پانی میں نکال کر دین اور جانور  
 سایہ دار مکان میں رہے نہ بھٹے لوگ قہد اس بیماری میں مفید جانتے ہیں  
 لیکن اصل بابت یہ ہے کہ ابتدا میں جب تک خون سرد اور گاؤں ہونے نہیں پاتا  
 فصد لینا فائدہ کر سکتا ہے اور پھر نہیں کیونکہ وہ اپنی تین بجڑ چھٹکے رگون  
 سے نکل نہیں سکتا۔ لگہ میں ایک سویشی بیمار ہونے سے اور دن کے بیمار ہو جانے کا  
 بڑے اسلئے نسخہ نمبر ۵ ہر ایک سویشی کو مطابق پھر دیا جاوے اور پانی میں منگ  
 یا شورہ ملا کر ملاوین اور صرف گہاس کھلائی جاوے اور تھوڑی تھوڑی ہیر میں ٹھلانا  
 بھی مفید ہے اور ہر ایک جانور کے ہونٹ پر بموجب ترکیب مندرجہ نسخہ ۶  
 سوڈا لگانا بھی فائدہ مند ہے یہ ترکیب اس بیماری کے روکنے کے لئے بہت  
 مفید ہے اور خاص کر کے جب ہری گہاس کے سوائے اور کچھ نہ دیا جاوے +  
 بعد مرنے کے آثار کسی ایک طرح کے پائے جاتے ہیں جبکہ یہ جگہ بدن میں  
 جان بیماری ہوتی ہے پانی خون ملا ہوا پایا جاتا ہے اور بڑے بڑے چکٹے  
 سیاہ خون کے پائے ملتے ہیں اور پانی سیاہ خون ملا ہوا اکثر سرد اور سردتر  
 زردی مائل ہوتا ہے اور چاروں طرف کا گوشت سیاہ ہو جاتا ہے اور ایسا سردتر  
 ہے کہ ہاتھ سے باسانی نہ سچ سکتا ہے اور پچھلے میں خون جمع ہو جاتا ہے اور  
 دل کی تھیلی اور اسکے چاروں طرف میں گاڑھا اور سرد پانی خون ملا ہوا اور پٹیا  
 کے اندر اکثر جگہ سیاہ خون کے چکٹے اور پانی خون ملا ہوا پایا جاتا ہے اور  
 مرے ہی بدن سترنے لگتا ہے + امتحان کرنے والے کو چاہئے کہ نہ پنے



ہاتھ کو زخم کے ہونے سے بچا دے ورنہ اس کو زہر کا اثر ہو کر ایک سخت بیماری ہو جائیگی ۔

روں اس مرض کی کرناہ نسبت علاج کے آسان ہے۔ لپٹے لپٹے نلکے کو نیچے زمین کے گہاس چرے نہ دیرم اور بیمار جانور سے بچاویں ۔  
 انگلستان میں جب یہ بیماری ہیڈ ٹرون کو پہنچتی ہے تو اس سے ہر کسی کہتے ہیں اور علاج اور نکاشل بڑے موشیوں کے بہ صرف دو کا وزن کم ہونا چاہئے علاج نسخہ جات کی فصل میں لکھے گئے ہیں ۔

## فصل چھٹی

سوجن حلق میں

اس بیماری کو بنگالہ میں گلا فولا سفر فی و سالی میں گھڑیوں پنجاب میں گلدن یا گلڈیا بھی میں اور د اور خدا اس میں چارسی تو دو کہتے ہیں اور اکثر نام جو فصل پانچویں کی بیماری کے لئے لکھے گئے ہیں انہیں ناموں سے یہ بیماری بھی مشہور ہے کیونکہ یہ دونوں بیماریاں ایک ہی قسم کی ہیں ۔

یہ ایک اڑ کے لگ جانے والی بیماری ہے جو خون میں زہر ہونے سے پیدا ہوتی ہے اور زبان اور حلق اور سانس لینے کے مقام پر سوجن ہو جاتی ہے زبان اور تالہ سے چاروں طرف خونی رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور سانس لینا اور کھینچنے میں بڑی دقت ہوتی ہے ۔

زہر کے اثر کرنے کے جس قدر دیر بعد علامت گہریا کی ظاہر

ہوتی ہیں اور سقندر اس بیماری میں بھی عرصہ لگتا ہے ۔  
 پہچان اس بیماری کی یہ ہے بخار کانوں کے نیچے اور جڑوں کے  
 درمیان کی گلیں اور زبان اور تالو اور گلے میں سوجن ہو جاتی ہے اور  
 رال بہتی ہے نکلنے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے کھانسی کی شدت اور  
 تنہون اور آنکھوں کے پوٹوں کے اندر سرخی سوجن ہر جگہ کا بڑھ جانا اور  
 جانور سانس لیتا ہے اور نکلتا ہے زیادہ دشواری سے اور سانس کی خیراٹ  
 دور تک سنائی دیتی ہے سانس میں بدبو زبان کا منہ سے باہر نکلا اور سیاہ ہو جانا  
 اور کہیں زبان پر زخموں کا پڑ جانا اور کئی ایک جگہ سے پ کا نکلا اور نیلی رنگ کے  
 داغوں کا پڑ جانا سانس لینے میں نہایت دقت کا ہونا اور کمر کو دم گھٹ کر جانور کا مرنا نا۔  
 اگر یہ بیماری نہایت سخت ہو تو ایک یا دو گھنٹہ میں جانور مر جاتا ہے ورنہ دو تین  
 دن تک جیتا ہے، فیصدی قریب انہی جانور اس بیماری سے مر جاتے ہیں ۔  
 یہ بیماری ان جانوروں سے بڑھ جاتی ہے کہ ایچ کر کے نہیں ذرا دیر ٹکرتا چاہے  
 اور شروع بیماری میں اگر نکلنے میں دقت بہت ہو تو مسطابق نسخہ نمبر ۳۱۰ کی  
 جلاب دیا جاوے۔ بعد اسکے حلق کی تدبیر ضرور ہے تاکہ سوجن اتنی زیادہ نہ ہو جائے  
 کہ سانس لینے کا مقام بند ہو کر دم رک جائے اسکے واسطے یہ علاج کرنا چاہئے  
 کہ حلق کے باہر چاروں طرف اور سانس لینے کے مقام کے باہر قدر دو تین  
 انچ کے اور جڑوں کے درمیان اور نیچے دو تین جگہ پر لوہا خوب اگر، میں  
 لال کر کے داغ دینا چاہئے بعد اسکے نسخہ نمبر ۱۰۱ یا ۱۰۲ آبلہ اور ٹھانیوالی دوا لالش  
 کریں اگر آبلہ اوٹھ آوین تو یہ علامت اچھی ہے اور نہ دھونے کے لئے نسخہ نمبر ۴۲

سے دھویا جاوے اور آدھ آدھ گھنٹہ پر نسخہ نمبر ۲ کی پیکاری دی جائے اور  
 پتلے ماڈ میں نمک اور دو واسطابق نسخہ نمبر ۳ ملا کر ملائی جائے چونکہ جانور کو  
 نگلنے میں دشواری ہوتی ہے پس دو دینے میں نہایت خبرداری کرنا چاہئے  
 تاکہ دم نہ گھٹنے پاوے کسی جانور کو مطابق نسخہ نمبر ۴ کے گندہک کی دھونی  
 دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جب کسی تدبیر سے فائدہ ظاہر نہ ہو اور جانور  
 دم گھٹنے سے قریب موت کے پہنچے تو گوڑے کے ڈاکٹر اکثر سانس  
 لینے کے مقام کے بیچ میں سوراخ کر دیئے ہیں سانس لینے کے واسطے اس  
 تدبیر سے جانور بعض وقت بچ جاتا ہے اگر سو جن حلق کے گرد بہت زیادہ  
 ہو تو دو ایک جگہ او سکے نیچے کی طرف تیز چہری سے چیر دینا چاہئے اور  
 زخم پر دو اہم جو نسخہ نمبر ۵ کے لگائی جائے۔  
 بعد موت کے یہ علامت ہے زبان نالو اور سانس لینے کے مقام کے  
 اوپر کا حصہ بہت سوجا ہوا اور سرخ ہو گا اور باجائزخم ہو جاتا ہے اور پیپ  
 داتا ہے اور منہ کے اندر اور زبان کے اوپر کی سطح الگ ہو جاتی ہے اور زبان اور نالو  
 بیگنی رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے بدبو شری ہوئی آتی ہے اور  
 حلق اور زبان کے کناروں میں زرد پانی خون ملا ہوا جمع ہو جاتا ہے اور کان  
 کے نیچے اور بیڑوں کے درمیان کی گلیٹیاں سوج جاتی ہیں پھیپھڑوں سے  
 بہر جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے علامت اسکی دیکھاری گھٹیا کی ایک ہی ہے۔  
 چونکہ یہ بیماری اوٹ کر لگجانیوالی ہے اور خون میں زہر اثر کرے تب سے پیدا  
 ہوتی ہے اس لیے وہ شخص جو کہ دوا پلاسے یا بعد موت کے لاش کو چیرے

چاہئے کہ اپنے ہاتھوں کو زخم سے بچا دے ورنہ زہر کا اثر اس کے ہاتھوں  
 بھی ہو جائیگا ہندوستان میں ایسے جانور کا گوشت جو اس بیماری سے مراد ہو  
 بعض جگہ میں زہر دار سمجھے ہیں اور اسی وجہ سے چار بھی نہیں کھاتے جنکو  
 اور مرنوں کے مردہ جانوروں کے گوشت کھانے سے پرہیز نہیں ہے +  
 جبکہ گلہ جانوروں میں بیماری پہلے ظاہر ہو تو وہ ہدائیں جو فصل اول  
 اور پانچویں میں لکھی گئی ہیں فوراً عمل میں لانی چاہئیں +

## فصل ساتویں

بھیر یون میں مائٹا کا نگر

اس بیماری کو بنگال میں بھیر یون، سندھ میں بھیر یون، اور  
 سندھ میں ویداروگ کہتے ہیں +

ہندوستان میں اکثر بھیر یون سے مائٹا کا نگر، بھیر یون، بھیر یون، بھیر یون  
 جیسا انسان کو مائٹا کا نگر سے ہوتا ہے، بھیر یون چھوٹا لگنے سے ہوتی ہے  
 اور بغیر چھوٹ لگے ہوئے ہرگز نہیں ہوتی +

بھیر یون لگنے سے بھیر یون ہی ہوتا ہے، بھیر یون ہی ہوتا ہے، بھیر یون ہی ہوتا ہے +

بیجان یہ ہے بھیر یون سے تار ہٹی اور بھیر یون سے تار ہٹی ہوئی ہے، بھیر یون سے تار ہٹی ہوئی ہے، بھیر یون سے تار ہٹی ہوئی ہے +  
 بلکہ کچھ بھی نہیں لگتی ہے بھیر یون کی کرتا موقوف ہو جاتا ہے اور بانو اکڑ جاتی ہیں بعد  
 اس کے کپکپی شروع ہوتی ہے بدن گرم ہو جاتا ہے، بھیر یون ہی ہوتا ہے، بھیر یون ہی ہوتا ہے، بھیر یون ہی ہوتا ہے +  
 کے نیچے جان کہ چڑھ چلا ہوتا ہے اور ردوان کم دھان پونے کے گرم معلوم





جب رکاوٹ ہوتی ہے تو جانور جو چیز پیتا ہے نالی میں ٹک کر منہ اور تھنوں کے راستہ اولٹ کر نکل جاتی ہے اور پہچان یہ ہے کہ جانور زمین رہتا ہے اور سکی صورت سے درد کا ہونا ظاہر ہوتا ہے جو چیز حلق میں ٹنگ گئی ہے اس کے دفع کرنے کے واسطے اگر جون کو تان دیتا ہے یعنی جانور کو شش کرتا ہو کہ چیز ٹنگ گئی ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر اندر پھل جھائے یا منہ کے راستہ باہر نکل آوے اگر جانور کا جلد حلق صاف نہ ہو تو بائیں طرف پیٹ پھول جاتا ہے اگر حلق میں کوئی چیز اٹکی ہو تو ہاتھ منہ کے اندر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور جو اوس حصہ نارہم جو درمیان پچھلے حصہ منہ اور سینہ کے ہی ہو تو گردن کی تلی کے ٹھونسنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔ اگر جب نالی کے اندر اشیاء دو جا کر اٹکی ہو کہ وہ مقام سینہ کے اندر ہاتھ سے معلوم نہ ہو سکے اوس حالت میں جانور پانی پیتا ہے تو دو چار گھنٹے آسانی سے پی جاتا ہے مگر جب رکاوٹ کے مقام تک پانی سے بہر جاویگا تو پھر جانور پانی زیادہ نہیں پی سکتا ہے بلکہ جو کچھ پیا تھا سب منہ اور ناک کے راستہ نکل جاویگا \*

علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ آدھ پاؤ اسی کا تیل ایک چٹاک ہندوستانی شرباب میں ملا کر اور گرم کر کے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ہوشیاری کے پلاوین اس تدبیر سے نالی اور وہ چیز جو اٹکی گئی ہے چکنی اور ملائم ہو جائیگی اور نالی کو اوس چیز کے ہینک دینے کے واسطے طاقت آجائیگی حلق کے بند ہونے سے تھوڑا آگے نکل جائیگی لیکن چاہئے کہ تھوڑی تھوڑی دوا ہر مرتبہ نکل جانے کے بعد دے تھوڑا کر حلق میں کوئی چیز اٹکی ہو تو آدھ گھنٹہ ڈال کر

محال لین اور جو گردنی نلی ٹٹو لٹنے سے نالی میں معلوم ہو تو قبل پلا سنے  
کے بعد ہاتھ سے دبا کر نیچے اوتارنے کی تدبیر کریں اور جب نیچے کو پھسلے  
پھسرتھوڑا سا تیل پلا کر اوسط طرح نیچے کو پھسلا میں اور یہی تدبیر کئے جائیں  
یہاں تک کہ نیچے کو اوتار جاسے اور جانور تیار رہے ہو جائے ۔

اور جب نالی میں سینہ کے اندر جا کر کوئی چیز ٹک گئی ہو اور تیل اور تھپ  
کے پلانے سے کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ نلی جسکا ذکر فصل نو میں ہے بشرط سٹنے  
کے خلق کے راستے نالی میں ڈال کر اس چیز تک پہنچا دیں جو اٹکی ہوئی ہے  
اور آہستہ آہستہ دبا دیں تاکہ اس کے دباؤ سے وہ چیز نیچے کو اوتار جائے اور  
جو اس قسم کی نلی نہ ملے تو بیدار نگلی کے برابر موٹا لیوین اور اس کے کنارہ پر  
روئی یا سن انڈے کے برابر گیند کی صورت بنائیں اور اس پر کپڑا لپیٹ کر  
اچھی طرح مضبوط باندھیں اور تیل میں بھگو کر خلق میں ڈالیں اور اس اٹکی  
ہوئی چیز کو دبا دیں + یہ تدبیر کرنے کے واسطے چاہئے کہ دوسرا آدمی جانور  
کے منہ کو خوب کھلا رکھے ۔

اٹکی ہوئی چیز نوکدار ہو یا بید کے سرے پر گیند اچھی طرح سے مضبوط باندھ دی  
گئی ہو یا بے احتیاطی یا زور سے گلے میں بید ڈالا جاوے تو بعض مرتبہ نالی  
میں زخم ہو جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتی ہے اور ایسوجہ سے پچارہ جانور کی یہ  
حالت یعنی گلے میں خوراک وغیرہ کا پھنس جانا اکثر ہوتا رہیگا ۔

اس بیماری سے آرام ہونے کے بعد کئی ایک روز تک نالی کمزور رہتی ہے اس  
زخم خوراک مثل دلیا یا لیدہ وغیرہ تین چار روز تک کھلاتا ہے بعد اسکے ہری گھاس دیکھا جاوے ۔



اگر کسی طرح اٹکی ہوئی چیز اندر کونہ اور گردن میں ٹوٹنے سے معلوم ہو تو اکثر گھوڑے کے ڈاکٹر صاحب نالی کو چھری سے چیر کر اٹکی ہوئی چیز کو نکال لیتے ہیں +

## فصل نویں

### پیٹ کا پھو سجانا

ہندوستان میں اس بیماری کے نام پیٹ گیو یا سٹلا ہے بعض مرتبہ پس چیا بھی کہتے ہیں +

اس بیماری میں اوچھڑی کے اندر ہوا بھرجاتی ہے + یہ بیماری اکثر جانور میں ہوتی ہے اور کھانے کی بد انتظامی سے بولشی ہوئی ہے یا ایسا کھانا دینے سے بسکی جانور کو عادت کھانے کی نہو یا بھو کا جانور جو ابتدا سے ایام ہر سات کی نرم اور سیلی گھاس پر گرتے ہیں اور زیادہ کھا جاتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں چونکہ اس مرض میں بہت سے جانور یک بیک بیمار ہو جاتے ہیں اسلئے یہ بیماری وبا کی معلوم ہوتی ہے اور کبھی اس مرض کا سبب لگ گھٹنا ہی ہوتا ہے جسکا ذکر فصل آٹھویں میں ہوا ہے +

اس بیماری کی علامتیں یہ ہیں، ظاہر ہوتی ہیں پیٹ کے بائیں جانب کا کچھلا حصہ پھول جاتا ہے اور ٹھنڈے سے اوچھڑی میں ہوا بھری ہوئی معلوم ہوتی ہے سانس لینے میں جانور کو دقت ہوتی ہے اور وہ اکہرتا ہے اور سر اور گردن

تھان لیتا ہے اور اگر جاتا ہے بعد اسکے سو جن زیادہ ہو جاتی ہے اسٹے سٹے سٹے سٹے  
 لینے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے اسٹے جانور جلد روٹھ جاتا ہے اگر ہوا  
 نکل نہ جاوے تو سانس لینے کی دقت ہر دم زیادہ ہوتی جاتی ہے نہ آخر کو سپٹ  
 بھول جاتے کے سبب جانور کھڑا نہیں رہ سکتا اگر اور دم ٹھکرا جاتا ہے +  
 اس بیماری میں اور بیماریوں کا دھوکا ہوتا ہے اور کبھی علامتوں کی  
 تیسری کے سبب سے زہر کا شبہ ہوا کرتا ہے اگر یہ بیماری شدت سے ہو تو جانور  
 ایک گھنٹے سے تین گھنٹہ کے اندر مر جاتا ہے اور اگر تھوڑی سی ہو تو آٹھ  
 گھنٹہ سے بارہ گھنٹہ تک زندہ رہتا ہے +

علاج اس بیماری کا یہ ہے جس قدر جلد ممکن ہو لٹو نمبر ۱۴۲ دیا جاوے اگر  
 دوائے اثر کیا تو فوراً جانور کو ڈکار آویگی اور سوجن پیٹ اور مشکل سے سانس  
 لینا کم ہو جائیگا اگر دوائے اثر نہ کیا اور جانور دم گھٹ کر مرنے کے قریب  
 ہو تو دوسرے آدمی کی مدد سے جانور کا نہ کھلو اگر چہ فٹ لمبی لچکدار نلی حلق  
 میں ڈاکر سانس کی نالی کے راستہ پیٹ میں پونہ دو تین تھامو اس نالی کی رہ سے نکل آویگا  
 ایسی نلی ہر ایک مالک مولشی کے پاس نہوگی اس واسطے تدبیر جو کہ اب لکھی  
 جاتی ہے فوراً کرنا واجب ہے +

## سپٹ میں سوراخ کر نیکی تدبیر

پیٹ کے بائیں جانب کے اوپر کے حصے پر اخیر پبلی اور کھولا اور گھمکی ٹیون  
 کے پنج میں خوب تیر نوکدار چھری یا چاقو سے آنا بڑا سوراخ کیا جاوے

اوس میں لگی چھوٹی منگلی کے برابر موٹی اور چھانچھ لمبی چلی جائے ایسی نلی داخل  
کرتے ہی ہوا میں نلی کی راہ سے نکلائے گی اور جانور کو آرام ہو جائیگا اس  
نلی کو ایک ٹنڈہ مسایا بینک کہنا۔ بیماری کے جاتے نہ رہیں لگی رکھیں اور  
اوس نلی کے باہر کے سرے کے پاس تین انچ لمبی لکڑی آڑی باندھ دیوین  
آٹھ ٹی بیٹ کے اندر نہ چلی جائے بعد اسکے ایک جلاب مطابق نسخہ نمبر یا نمبر  
کے دیا جاوے۔

بیبا۔ جانور کو بری گھاس تھوڑی تھوڑی کھانکودین مگر زیادہ نہ کھلاوین  
اگر کھرے ایک جانور کو بیماری ہو جائے تو اور جانور کو زیادہ کھا جائے  
۔ پوتا پاتا ہٹے۔

## فصل دسویں

### بھول جانا یا اڑ جانا چارو کا اور چھڑی میں

بیماری بھڑ اور مویشی دونوں کو ہو سکتی ہے۔

موٹا اور سخت چارہ جیسا اولو گھاس یا سرکنڈہ کھا جانے سے بڑا مدہ  
بھول جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت دنوں کا بھوکا ہو یا اوسکو  
ڈرا تھوڑا چارہ ملا ہو پھر مزہ دار چارہ بہت سا کھا جائے تو بیماری

ضرور ہوتی ہے اور بہت دانہ کھانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور کبھی کم پانی پلنے سے بھی +

جب معدہ میں کھانا زیادہ جاتا ہے تو اسکی اسی حرکت کم ہو جاتی ہے اور کھانے کے بوجھ اور پہلاؤ سے معدہ پھیل جاتا ہے آخر کار کمزور ہو کر ہجرت ہو جاتا ہے +

اس بیماری اور جو کہ فضل نو میں لکھی گئی ہے علامتیں ایک دوسری سے ملتی ہیں مگر اس بیماری میں جو کہ فضل نو میں لکھی گئی ہے معدہ ہوا کے باعث سے پھول جاتا ہے اور اس میں زیادہ کھانے کے سبب سے یہ بیماری آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے جانور پہلے شست ہو جاتا ہے جگالی مینن کڑا اور بائیں طرف کا پیٹ آہستہ آہستہ پھول جاتا ہے اور بے اور سکواں لنگی سے ٹھوکین توڑ ہول کی سی آواز نہیں آتی جیسے کہ فضل نو میں بیان کیا گیا ہے بلکہ وہ جگہ سخت اور ٹھوس بہ سبب زیادہ کھانے کے معلوم ہوتی ہے اور جو لنگی سے دبائیں تو گرٹھاڑ جاتا ہے جیسا نرم مٹی کے اندر دبانے سے اور پیٹ کچھ قبض ہو جاتا ہے + ایک گھنٹہ کے عرصہ میں ان علامتوں کی تیزی ہوتی جاتی ہے جانور اپنے نتھنوں کو اوٹھائے رہتا ہے تاکہ سانس آسانی لے سکے اور سانس جلد جلد لیتا ہے اکثر کہتا ہے اگر جانور بیٹھے تو دانت پہلو پر ٹھیتا ہے لیکن جلد کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹھنے سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اسوجہ سے جانور کھڑا رہتا ہے اور شکل سے سانس لینا ہے اور کہتا اور دانت ہٹاتا ہے پھر سب کھانا ڈالتا ہے اور جب اسکا خمیر اوٹھتا ہے تو معدہ اور بھی

بمعمول جاتا ہے جنہیں ہلکی اور کمزور وجوہاتی ہے آخر کار سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور جانور گر کر اور دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔

یہ بیماری ایک دن سے تین دن تک رہتی ہے۔

علاج اس بیماری کا اسطور سے کرنا چاہئے کہ معدہ کی حرکت شروع ہو جائے تاکہ کھانا نیچے اتر جائے اس مطلب کے لئے ایک تیز جلاب مطابق نسخہ نمبر ۶ دو یا تین سیر گرم پانی کے ساتھ ملا کر پلا دے اور پچکاری گرم پانی اور صابون کی تیل ملا کر مطابق نسخہ نمبر ۶ ہر پاؤ گھنٹہ کے بعد دیتے رہیں اور سوائے اسکے پیٹ پر خاص کر کے بائیں طرف ہاتھ سے مالش کرتے رہیں اور نسخہ نمبر ۷ کے مطابق سینک کریں اور دو یا دو نسخہ نمبر ۸ میں لکھی ہوئی ہے آدھی چھٹانک یا ایک چھٹانک اسی کے تیل میں ملا کر تین تین چار چار گھنٹہ بعد دین + اگر پندرہ بیس گھنٹہ کے اندر دست نہ آوے تو دوسرا جلاب مطابق نسخہ نمبر ۹ کے دین اور پچکاری بدستور دیتے رہیں اگر جانور دست یا بیہوش ہونے لگے تو وہ مطابق نسخہ ۱۰ بار بار کھلا دین اور جانور کو گرم پانی یا اسی کا پتلا ملائم حسب قدر پی سکے پلا دین + جب دست جاری ہو جائیں اور بیماری کی علامتیں کم ہوں تو کئی روز تک سوائے اسی کے دین اور چوک کی سانی کہ جس میں آدھی چھٹانک یا ایک چھٹانک ملا ہو اور کچھ کھانا نہ کھلا دین جب تک علامتیں پیٹ پھولنے کی جاتی رہیں تب نرم اور پختی گھاس تھوڑی تھوڑی دین زیادہ گھاس دینے سے بوجھ کمزوری معدہ کہ پھر بیماری کے لوٹ آئے گا ہے جس حالت میں کوئی دوا اثر نہ کرے اس لئے اس کے علاوہ

زیادہ ہوتی جاوین تو یہ آثار معدہ کے پھول جائیکے ہین اور اوسکی پہچان  
یہ ہے کہ اگر پیٹ کو اونگلیوں سے دبائیں تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور  
اگر معدہ کے اندر سے کھانا نہ نکالا جاوے تو جانور کو سانس لینے میں دشواری  
ہوگی اور کھانے اور پینے کا ایسا وقت ہین اوس جانور کو آرام دینے کی  
ترکیب ایک ہی ہے یعنی بائیں پہلو پر پچھلی پسلی اور کولے کے ہڈی کے بیچ میں  
دو اینچہ نیچے نیز چھری سے چھپا آٹھ اینچہ لمبا شگاف کرین اور بہت کی دیوار  
کو تراشیدہ پھر معدہ میں شگاف دیکر اور ہاتھ ٹوا کر کل کھانا نکال لیں اور پھر  
جلا ب مطابق نسخہ نمبر ۲ یا ۵ سے ایک سیر یا دو سیر اسی کے انڈ میں ملا کر اوس  
شگاف کی راہ معدہ میں ڈالیں پھر اوس شگاف کو سیکر پیٹ کے شگاف کو بھی  
سی دیں اور مرہم بموجب نسخہ نمبر ۳۳ یا نسخہ نمبر ۴۴ کے لگا دیں +  
اس ترکیب کے کرنے کے واسطے آدمی واقفکار ہونا چاہئے اور گو کہ یہ  
تدبیر نہایت مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن معدہ میں اگر مرض کی کثرت کے سبب سے  
سو تن زیادہ ہو گئی ہو تو جانور اس حکمت سے اکثر بچ جاتا ہے +  
روک اس مرض کی اسطور پر ہو سکتی ہے کہ جس سبب سے یہ بیماری ہوتی  
ہے ہونے نہ دیوین +

## فصل گیارہویں

کھانے کا رکیما پیٹ کی اور جھمڑی میں  
سفتہ اور سوکھا کھانا تیسرے معدہ میں تن ہو کر حجم بناتا ہے اور سخت ہو کر

معدہ کی حرکت میں خلل کرتا ہے اور بحالت زیادہ ہونے بیماری کے بالکل بند کر دیتا ہے ۔

یہ بیماری خاص کر گرمی اور اسوقت میں ہوتی ہے جب بسبب نہ ملنے چارہ اور پانی کے بجائے اور مویشی بھوکا چارہ سخت اور ریشہ دار گیا سس سرکڑھ یا جمناڑ جھنکار کھاتے ہیں چونکہ پت اور جھڑی یعنی تیسرے معدہ سخت چارے کو ہضم نہیں کر سکتا اسلئے بالکل کھانا اکٹھا ہو کر جم جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے یہی پہچان اس بیماری کی یہ ہے جانور جو گالی نہیں کرتا بھوک کم ہو جاتی ہے سانس جلد جلد لیتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ مرض پھیپھڑوں سے مین پیٹ قبض رہتا ہے مگر کبھی شروع بیماری میں تھوڑے تھلے دست آتے ہیں جس میں سخت سیاہ رنگ جمع ہوئے چارہ کے ٹکڑے نکلتے ہیں پیشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اکثر معدہ میں سوزش ہوتی ہے جانور سانس جلد جلد لیتا ہے اور زور سے کہتا ہے دانت پیتا ہے اور اسکی صورت سے ٹیکف کا اثر معلوم ہوتا ہے منہ اور کان اور سینگ سرد ہو جاتے ہیں اور نبض بہت کم چلتی ہے اور ناک کی مانند تپلی ہو جاتی ہے اور ایک منٹ میں پچاس سے تلو ضرب تک حرکت کرتی ہے گوبر تپلا اور بہت بدبودار ہوتا ہے اور اس میں کیس قدر سخت ٹکڑے بھی ملے رہتے ہیں جانور کراہتا ہے اور اخیر درجہ میں کبھی بیہوشی بھی ہو جاتی ہے اور بعضے مرتبہ نہایت پچینی + یہ آثار چستہ کی سوزش کے سبب سے ہیں ۔

پانچ دن سے پندرہ دن تک یہ بیماری رہتی ہے ۔

علاج - سخت اور سوکھا کھانیکہ جو معدہ میں رک گیا ہے دفع کرنا ضروری ہے

اسلئے جلاب کا نسخہ نمبر ۴۶ فوراً بلایا جاوے اور چھٹانک ڈیڑھ چھٹانک  
شراب آدھ سیرالسی کے گرم مائڈین مطابق نسخہ نمبر ۵۹ کے ہر پانچ پیچہ گھنٹہ  
بعد دیا جاوے +

السی یا چاول کا تھلا مانڈ کھلانا چاہئے تاکہ اوسکے ذریعہ سے تکررے  
نرم ہو کر خارج ہو جاوین اگر چوبیس گھنٹہ کے اندر دست نہ آوین تو اوس جلاب  
کو آدھا پھر لاپو اور شراب اور مائڈ بدستور دئے جاوین جب تک دست نہ آوے  
اور پیٹ کی سینک مطابق نسخہ ۵ کے کجاوے اس بیماری کے علاج میں  
پچلے مائڈ یا زہ پلانا غرور ہے کیونکہ اوسکے ذریعہ سے تیسرے معدہ پر  
دواؤں کی تاثیر بڑھ چکی اور کھانا جو رک گیا ہے وہ نکل جائیگا مائڈ زبا وہ دینے  
سے سخت اور تہی بدئی چیزوں کو مانع کرنا ہے اور تیسرے معدہ کے اندر سے نکالتا  
ہے اور چوتھے معدہ اور اترتھین میں اوتارنے کی مدد کرتا ہے + چونکہ سخت چیزوں  
کے نکلنے میں کئی دن گزر جاتے ہیں اسلئے چاہئے کہ مائڈ برابر دیا جائے  
جب تک دستوں میں سخت کڑے آتے رہیں جب آرام کے آثار معلوم ہونے  
لگیں تب ہری گھاس تھوڑی تھوڑی دی جاوے اور کئی دن تک نرم کھانا  
کھلایا جاوے کیونکہ ایسے جانور کو سخت اور سوکھی گھاس دینے سے  
بیماری کے لوٹ آئیکا اندیشہ رہتا ہے +

جب کوئی جانور دس بیماری سے مر جاوے اور اوسکے پیٹ کو جاک کر کے  
دیکھا جاوے تو پتا اوچھری یعنی تیسرا معدہ سخت معلوم ہووے گا اور اوسکے اندر  
اور سر کے ریشہ دار چارہ کی ٹھیکیاں شکل کھل کے پھنسی اور بھئی ہوئی ہوں جائیں گی



اس بیماری کے روک کی یہ ترکیب ہے کہ جب ایک جانور کو کسی گلہ میں  
یہ بیماری ہو جائے تو اور جانوروں کو نرم اور آسانی ہضم ہونے والی گھاس  
کھلائی جاوے اور پانی خوب پلایا جاوے +

## فصل بارہم

### لال پانی یا کالے پانی یا خون پشیا کے پیمانہ

اس بیماری کو ہندی میں لال پشیا اور بنگالی میں رکتوموترا کہتے ہیں +  
یہ بیماری خون کی ہے اور کھانا بخوبی ہضم ہونے کے سبب پیدا  
ہوتی ہے جب کھانا ہضم نہیں ہوتا خون اچھی طرح پیدا نہیں ہوتا اور تپلا اور  
کمزور ہو جاتا ہے +

اس بیماری میں بڑی کمزوری ہوتی ہے اور جب بیماری نہایت سخت ہوتو  
بدن بھی نہایت تپلا ہو جاتا ہے + بھیڑ اور پوشی دونوں کو یہ مرض ہو سکتا ہے  
لیکن اکثر گائے اور بھیڑ کو بچہ دینے کے تھوڑے دن بعد ہوتا ہے اور شاید  
دو دو دینے کے سبب جس سے کمزوری ہو جاتی ہے یہ بیماری پیدا ہوتی  
ہے +

بعضی جگہ جہاں کہ زمین سیلاب دار یعنی جہاں پانی مڑا ہوا ہوتی ہے اسی  
گھاس پیدا ہوتی ہے جسکے کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھاس  
اکثر رطوبتی ہوتی اور کمزور ہوتی ہے اور اس میں تائثر نہ ہوتی ہوتی ہے

یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ ایسی زمین اگر برابر کر دی جائے تاکہ پانی جمع نہ ہو اور اوسمین کھاڈو اگر کھیتی کی جائے تو پھر اُسکی گھاس کھانے سے یہ بیماری نہیں ہوتی + یہ مرض اکثر غریب لوگوں کے جانور دن کو ہوتا ہے جنکو اچھی طرح چارہ نہیں ملتا اور سیلاب دار زمین میں جو خراب پانی ہوتا ہے اوسکے پینے سے خاص اوس موسم میں جب جانور دن کے پڑانے ردین گرتے ہیں اور نئے ردین نکلتے ہیں یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے جو مویشی ایسی زمین کا چارہ کھاتے ہیں جہاں پانی بھرا ہوتا ہے یا کھاڈ نہیں پڑتی وہ اکثر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں غرض کہ یہ بیماری پانی اور کھانے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے خاصکر کے ایسے کھانے سے جو دیکھنے میں بہت ہو مگر قوت کم ہو تو ایسے کھانے سے خوب دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کہ سوائے دبلے ہونے کے خون میں اور دوسری خراب میلی چیز فکر پتیا بکے ساتھ مکمل جاتی ہے +

پہچان اس بیماری کی یہ ہے شروع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور اچھی طرح تازہ نہیں ہوتا اور کبھی اچھی طرح چارہ نہ کھانے کے باعث بیمار معلوم ہوتا ہے اور اچھی طرح جگالی نہیں کرتا + دودھ داری گاسے کا دودھ کم ہو جاتا ہے ردین پھٹ جاتے ہیں بدن کا چمڑا خشک اور زردی ائل معلوم ہوتا ہے جانور پیٹھ، خمار ہو جاتی ہے اور جانور دن سے علیحدہ کھڑا ہوتا ہے دو یا تین دن تک بدست ہوتے ہیں پھر پیٹ قبض ہو جاتا ہے کو کچھ سپک جاتی ہے پیٹ میں درد کی علامت ظاہر ہوتی ہے اسوقت تک پتیا بک کے نگ میں کچھ

تبدیلی نہیں ہوتی اور یہی حالت دستوں کے جاری رہنے تک رہتی ہے مگر قبض کے شروع ہوتی ہی پیشاب خوب سُرخ ہو جاتا ہے اور پیشاب کرنے کے وقت جانور کو کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ قبض چوتھے دن ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بار بار پیشاب ہوتا ہے نہایت سُرخ رنگ اور بدبودار بلکہ گھری سُرخ کے باعث سے پیشاب کا رنگ سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اسی سبب سے اس بیماری کو انگریزی میں سیاہ پانی بھی کہتے ہیں۔ جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے اور منہ اور پوٹوں کے اندر کی مچلی مچلی پڑ جاتی ہے آنکھیں دھنس جاتی ہیں منہ اور کان اور ٹانگیں سرد ہو جاتی ہیں نبض کمزور سانس جلد جلد آتی ہے۔ جانور اکثر پڑا رہتا ہے اور بہت جلد ڈبلا ہو جاتا ہے علامتیں پیٹ کے درد کی اکثر ظاہر ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ بیماری پانچ یا چھ دن سے پچیس دن تک رہتی ہے۔

علاج یہ ہے شروع بیماری میں دو مطابق نسخہ نمبر ۱ کے فوراً دینا چاہئے تاکہ کھانا جو کہ ہضم نہیں ہوا نکل جائے اور بعد دست آنے کے دو مطابق نسخہ نمبر ۲ یا نمبر ۳ یا نمبر ۴ کے دیکھائے۔ جب ایک متناوب جلاب کافی نہ ہو تو بارہ گھنٹہ کے بعد دوبارہ آدھا جلاب پھر دیا جاوے۔ کھانے کے واسطے اسی یا چاول کا ماڈا اور ہری نرم گھاس دین۔

اس بیماری کے دوسرے درجہ میں اگر دست بہت آئے لیکن اور جانور کمزور ہو جا جائے تو نسخہ نمبر ۱۳ دیا جاسکتا ہے مگر وہ دوا مین جو قبض کرتی ہیں کم اور نہایت خوشہ یارسی کے ساتھ دینا چاہئے۔ جانور کی طاقت قائم



اور شروع میں علاج کرنے سے جلد فائدہ ہوتا ہے خاصکر اون جانوروں کو  
 جنکو علاوہ علاج کے اچھا ماٹھ اور دو بگھاس اور نرم چارہ دیا گیا ہو +  
 جب کسی چراگاہ کی گھاس کھانے سے یہ بیماری ہو تو وہاں کی زمین کو برابر  
 کر ڈالنا چاہئے تاکہ پانی وہاں نہ ترکنے پاوے اور وہاں کھاؤ ڈال دینا  
 چاہئے + اگر مالک چراگاہ کو اس قدر مقدور نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ اوس زمین پر  
 بل چلا کر کچھ اور غلہ بودین +

## فصل تیرہم

### پیٹ کا چلنا

اس بیماری کو پنجاب میں بھوکٹی اور بنگال میں پیٹ ٹائین ہر کہتے ہیں +  
 اس میں گھڑی گھڑی دست آتے ہیں گرجار وغیرہ اسکے ساتھ نہیں  
 ہوتا لیکن سیتھرسپیٹ میں درد ہوتا ہے معدہ اور انتڑیوں کے سبب سے  
 دست پٹیلے بہت آتے ہیں +

سبب اس بیماری کا خراب چارہ اور زہر دار پھول پتی کھانے یا گندہ  
 پانی پینے سے ہوتا ہے بعض جگہ کی زمین ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہاں کی گھاس  
 کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے اور ایسے زمین اکثر دلدل ہوتی ہے +  
 پنجاب میں اس بیماری کو بھوکٹی کہتے ہیں اور تھوڑے سے دلوں سے اوس  
 ملک کے کچھ پیشیدہ کو اوس موسم میں یہ بیماری ہوتی ہے جبکہ بار بار یہی شکل سے

ملنے کے سبب سے جانور خراب چارہ اور زہر داسپتی کھا جاتے ہیں اور بہت گندہ پانی پیتے ہیں + یہ بیماری ایک بڑی مقدار جلاب سے اور زیادہ چارہ کھا جانے سے بھی ہو سکتی ہے +

پھپھڑوں کی بیماری میں اور خون کی اور بیماریوں کے اثر و رہتین بھی پیٹ چلنے لگتا ہے + پیٹ میں یکایک سردی پھونپنے سے خائفہ کر کے اس صورت میں جیکہ انٹریون میں کسی طرح کا غصہ آد یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ سخت گرمی یعنی تیز دھوپ کے اثر سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے اکثر نئی گھاس کھانے سے جب اول بارش میں پھوٹ نکلتی ہے جانور و نکویہ بیماری ہو جاتی ہے +

پہچان اس بیماری کی یہ ہے جانور گھڑی گھڑی ہٹا گوبر کرتا ہے اور بڑا نکلتی ہے مگر شروع میں درد یا کو تھنا نہیں ہوتا + بولکھ کم نہیں ہوتی مگر جگالی کرنے میں کسی قدر فرق ہو جاتا ہے + اور دودھ دینے والے جانور و ن کا دودھ کم ہو جاتا ہے مگر انکی صحت میں بالکل فرق نہیں پڑتا البتہ اگر پیٹ بہت دنوں تک چلتا رہے تو جانور گوبر کرنے کے وقت کو تھنا ہے اور پیٹھ خراب ہو جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف ہے اور کبھی گوبر کے ساتھ خون بھی آتا ہے + پنجاب میں اس بیماری سے جانور مر جاتے ہیں کیونکہ اصلی سبب اس بیماری کا قائم رہتا ہے +

علاج کی تدبیر منحصر ہے اس سبب پر جس سے یہ بیماری ہوتی لیکن قاعدہ علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ چراگاہ یا چارہ اور پانی تبدیل کر دیا جاوے اور نرم اور چھٹا چارہ اور میٹھا پانی دیا جاوے بعد اُس کے نسخہ نمبر ۲۲ اور اگر کو تھنا

یاد روپیٹ کی علامتیں پانی جاوین تو آٹھ ماشہ یا ایک تولہ افین اسی نسخہ  
 زین جاوین + اگر بیماری تیز ہو تو صرف چاول کا مائڈیا چکر کر سائی ٹھلائی جاوے  
 اگر نسیہ ہو کہ ادھر لکھا جاوے دینے پر بھی بہت جاری رہیں تو نسخہ نمبر ۱ دینا چاہئے  
 اور اگر ضرورت ہو تو پھر دوا روپیٹ فرمایا جائے مگر چارہ کا بندوبست کر لے  
 ضروری بات ہے کہ رجب و صفر میں دوا پانی کے بدلے کئی روز تک  
 پانی لے لے اسی گھنٹوں کے آدے کا انڈیلادون + اگر جانف کزور اور قہلا ہو گیا  
 ہو تو نسخہ نمبر ۱۲ یا ۱۶ دن میں ایک یا دو دفعہ دینا چاہئے۔ اگر یہ بیماری بہت  
 مدت تک رہے تو نسخہ نمبر ۳ یا ۴ دیا جاوے۔

جزیرہ زین کو یہ بیماری ہو اگر کوئی علاج شرفیج سے نہ آیا جاوے  
 اور سایہ و آبگاہ میں باندھے جاوے اور کھانا ملائیے اور لکھنؤ سے  
 آجیہا سے قراقرم کیجئے جو جاوے۔

## فصل چہارم

### پیشہ میں

اس بیماری کو بگاڑنے والی امانتیں ہیں:

اصطیاق ۱۔ ایٹا کی پیڑ سے بڑی بٹریوں سے اندر سو جن ہلکائی  
 دیا کہی گئی اور میں رخم بچا جائے۔ اور تو اجڑا اور موٹا ہو کر  
 اتمہ جو کہ میا چا بہ طاہر ۱۰ سبب ہے۔

پیش کبھی بعد پیٹ چلنے کے ہوتی ہے یا ترابا گھاس یا چارہ کھانے سے یا گندہ پانی پینے سے یا رات کے وقت سردی اور اس میں رہنے سے ایسے موسم میں جبکہ دن میں بہت گرمی ہوتی ہے یہ مرض ہو جانا ہے خاص کر کے اون جانوروں کو جو کہ دلدل زمین پر رہتے ہیں +

جب یہ بیماری پیٹ چلنے سے ہو دسے تو اول میں وہی علامتیں جنکا بیان پہلی فصل میں ہوا ہے پانی جانینگلی لیکن اکثر یہ بیماری بغیر پیٹ چلنے کے بھی یکایک ہو جاتی ہے + جانور کو جاڑا دیکر بخار چڑھ آتا ہے اور گھڑی گھڑی گوبر کرتا ہے اور گوبر کچھ سخت اور کچھ تیلانہ اور آٹوٹا ہوا کرتا ہے اور آٹو جمی ہوتی انڈے کی سفیدی کی مانند ہوتی ہے پیٹ کا درد مطلق ہوتا ہے جانور بار بار زور سے کونھتا ہے اور گوبر کر نیکا ارادہ کرتا ہے تو وہ مقام بوجہ زور کر نیکے نکل آتا ہے اس بیماری میں جگر کے اندر اکثر فساد ہوتا ہے اسلئے تنہا اور پوٹوں کے اندر کی کھال زردی اٹل ہو جایا کرتی ہے +

مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۷ کے یہاں تک سینک کرنا چاہئے کہ وہ جگہ ٹرخ ہو جائے یا وہ ہے کو آگ میں گرم کر کے پیٹ پر ہلکا داغ دیوین اور نسخہ نمبر ۴ دینے کے بعد اگر کونھنا جاری ہے تو ایک رسی سے کمر کو کسکر باندھ دیوین اور کبھی کبھی مطابق نسخہ نمبر ۵ کے پچکاری دیتے رہیں + ایک دو دن تک دستوں کو کسیدہ جاری رہنے دین مگر زیادہ نہوٹے دیوین پھر نسخہ نمبر ۶ دیا جاوے کھانے کے واسطے صرف نانڈ دینا چاہئے جسمین آدھا چاول اور آدھی اسی ہو اور تھوڑا سا نمک بھی ملا دین اور کھل پکا کر بھی کھلانا چاہئے + اگر پیش



جاری رہے تو سترہ نمبر ۴ دن میں ایک یا دو دفعہ دیا جاوے اور جانور کو کھانا  
 چاول کے مانند پرکھین جب تک گوشت نہ کرنے لگے پھر چاول اور اسی  
 برابر وزن لیکر اوسکا مانند دیا جاوے + جب جانور اس بیماری سے اچھا ہونے  
 لگے تو اوسکو صرف نرم اور وہ کھانا جو کہ جلد ہضم ہو دینا چاہئے ورنہ  
 بیماری کے لوٹنے کا اندیشہ ہے + تھان صاف اور سوکھا اور اونچا اور ہوادار  
 ہونا چاہئے + رات کو جب سردی ہو تو کھل اوڑھا دیں +  
 بچک کے آخری درجہ میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے مگر جب صرف پیش ہو  
 تو اس میں اور علامتیں چپک کی ظاہر نہیں ہوتیں (دوسری فصل کو دیکھو)۔

## فصل تندرہوین جگر کے کیرے کی سیان میں

یہ بیماری خاص بھیترون کو ہوتی ہے +  
 اس بیماری میں بھیترون کے جگر کے اندر تھیلی میں کیرے پیدا ہو جاتے  
 ہیں + پچی زمین کا چارہ کھانے سے یہ بیماری ہوتی ہے اگر ایسی زمین ڈھالو  
 کر دیا جائے تو پھر وہاں کے چارہ کھانے سے کچھ فرقہ انہیں ہوتا +  
 یہ بیماری آہستہ آہستہ ہوتی ہے یعنی بھیترون رفتہ رفتہ لاغر ہوتی جاتی ہے اگر  
 کوئی اور ان پر ہاتھ رکھ کر دبا یا جاوے تو چمڑے کے نیچے کرکراہٹ کی  
 آواز معلوم ہوتی ہے اول تو رنگ چمڑے کا تبدیل ہو کر بہت پھیکا پڑ جاتا ہے

اور اس کے اوپر کی اُون کمزور ہو جانے کی وجہ سے آسانی اور کھڑا آتی ہے اور  
 کچھ روز کے بعد چمڑا بد رنگ ہو جاتا ہے اور اس پر زردی بالکل سیاہ دیکھنے پر آتا ہے  
 بین تھو تھن کے نیچے سوجن ہو جاتی ہے بلکہ کینتھر سوجن تمام بدن میں ہو جاتا ہے  
 آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے آنکھ کی سفیدی زرد ہو جاتی ہے پیٹھ دب جاتی ہے  
 اور پیٹ بڑھ جاتا ہے پیاس بہت لگتی ہے بھوک زیادہ ہو جاتی ہے یعنی بھینٹ  
 چارہ خوب کھاتی ہے لے کر کھانتی ہے یہ کھانسی پھیپھڑے میں کیڑے پیدا ہو جانے  
 کے باعث سے ہوتی ہے یہ کیڑے نل بگڑے کیڑوں کے نہیں ہوتے بلکہ  
 سوت کے مانند پتلے ہوتے ہیں + دست جاری ہو جاتے ہیں کبھی شروع مرض  
 سے اور کبھی کچھ عرصہ کے بعد اور وزیر وزیر بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ نہانور  
 کمزور اور دبا ہو کر مر جاتا ہے +

جب یہ بیماری لگے میں پیدا ہو تو بھڑوں کو اونچی اور برابر زمین پر لیجانا  
 چاہئے جہاں بدبودار پھینکی گھاس نہ ہو بیمار بھینٹ کو سایہ دار اور سوکھے مکان میں  
 رکھنا چاہئے اور نسخہ نمبر ۱ کو ایک یا دو دفعہ دن میں دینا چاہئے + کھانا سوکھا  
 اور قوت دار ہو مثلاً وہ گھاس جو کہ اونچی زمین پر پیدا ہوتی ہے کھلاوین اور  
 دانہ یا کھلی یا چاول کا ماڈ تھوڑا سا نمک ملا کر دین +

جو بھینٹ اس بیماری میں مری ہو اس کو چیر کر دیکھیں یہ علامتیں پانی جاوینگی  
 رگبن گل گئی ہوگی چمڑا زردی بالکل اور پیٹ میں پانی کی علامتیں پانی جاتے کی جگہ دست  
 نہیں ہوگا اور بھینٹ کی صورت کے کیڑے پیٹ کی نالی اور چوتھے معدے اور انٹسٹائن کے  
 اوپر کے حصہ میں پائے جائینگے رگون میں بہت کم اور پتلا پھینکے رنگ کا خون ہوگا +

جس رین کے چارہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہو وہ زمین برابر اور ڈھالو  
کر دی جائے اور چونا اور راکھ اور نمک وہاں ڈالا جائے تو یہ بیماری دور  
ہو جائیگی ۔

## فصل سو لھوین کھانسی مین

ہنگلی زبان مین اسکو کاشی کہتے ہین ۔

اس بیماری مین سانس لینے کی نالی اور اوسکی شانخون مین جو پھپھڑون  
مین جا کر پھیلیتی ہین سو جن ہو جاتی ہے ۔ اگر علاج گلے کی سو جن کا نہ کیا جائے  
تو یہ بیماری ہو جاسکتی ہے ۔ پھپھڑون کی سانس لینے کی نالی اور اوس کی  
شانخون مین اس قسم کی سو جن ہونے کا یہ باعث ہے کہ اول مین باریک سوت کی  
ماند کیڑے پیدا ہو جاتے ہین ۔

یہ بیماری پھپھڑون اور بھپھڑون کو اکثر ان کیڑون کے پیدا ہونے سے  
ہوتی ہے اور ان کیڑون کے اٹھنے سے کھانے کے ساتھ یا اور کسی طرح پیٹ کے  
اندر جا کر کیڑے بن جاتے ہین زیادہ عمر کے مویشیوں کو جب کھانسی کی بیماری ہوتی  
ہے تو اکثر سردی کھانے اور بھگینے یا کسی اور ایسے سبب سے ہو جاتی ہے جس سے  
گلا سمج جائے یا نکام ہو جائے ۔

زیادہ عمر کے مویشی مین اس بیماری کی علامتین مثل سوج جاسنے کے

ہوتی ہیں جسکا ذکر فصل چہلہ میں ہوا۔ پہا دل بہت خشک اور کھڑکھری کھانسی ہوتی ہے سانس جلد جلد چلتی ہے اور اوسکے ساتھ سائین سائین کی آواز آتی ہے اگر علق کے نیچے کان لگائیں تو یہ آواز بخوبی سنائی دیتی تھوڑے عرصہ کے بعد رطوبت پیدا ہو کر کھانسی تیز ہو جاتی ہے تب سانس لینے میں خراہٹ ہو جاتی ہے اور کھانسنے میں ناک سے رطوبت اور تڑ سے بلغم نکلتا ہے پچھڑے یا بھیڑ کو بسبب پیدا ہو جانے کیڑوں کے جو کھانسی ہوتی ہے تو اونکی کھانسی کھس کھس ہوتی ہے اور بار بار اونٹھٹی ہے اور کھانسی کے ساتھ کسیقدر آواز رائین سائین کی بھی آتی ہے کھانسنے وقت جانور اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اوسکے اگلے پیر آگے کو بڑھ کر ہوتے ہوتے ہیں اور کنیاں باہر کو جھکی ہوئیں گردن نیچی ہوئی سر تھوڑا جھکا ہوا اس غرض سے کہ کھانسنے وقت تکلیف نہو اور بلغم کے ساتھ کیڑا نکلیجائے جانور وزرہ وزرہ ہلا ہوتا جاتا ہے اور اکثر دو تین ہفتہ میں مر جاتا ہے جب یہ بیماری ایک جانور کو ہو تو گلہ کے اکثر جانور و نکو بھی ہو جاتی ہے۔

جب کوئی علامت کھانسی کی بڑی عمر کے مویشیوں میں پائی جائے تو فوراً علاج کرنا چاہئے۔ دوا ابلہ اوٹھانیوالی مثلاً نسخہ نمبر ۱۱ کو علق کے نیچے اور گردن پر خوب ملا جائے یا لوہا گرم کر کے داغ دین اگر مرض سخت ہو تو دو دن باتین کرنا چاہئیں پھر نسخہ نمبر ۲ جسکے دینے کی ترکیب نسخہ نمبر ۴ میں لکھی ہے دینا چاہئے اور جانور کو سایہ دار مکان میں رکھیں سیلے اور ہند مکان میں ہرگز نہ باندھیں تاکہ سانس لینے کے واسطے اچھی ہوائ ملے اور چاول یا اسی کا مٹو یا دھڑک کی سائی میں نسخہ نمبر ۱۲ کا سفوف ملا کر بن میں ایک یا دو دفعہ

دین اور اگر سردی ہو تو رات کو گل اوڑھا دین اور سوکھی گاس نیچے بچھا دین  
 آبلہ کا زخم ہر رکھنے کے لئے نسخہ نمبر ۷ زخم پر دو دفعہ دن میں ملتے رہیں + اس  
 بیماری کے ساتھ کبھی کبھی مرض بھیسٹھ سے کی علامتیں جنگا بیان فصل چوتھی میں  
 کیا گیا ہے ظاہر ہوتی ہیں + جب بھیسٹھ یا بچھڑون کو کھڑون کی وجہ سے کھانسی  
 ہو تو نسخہ نمبر ۲ بچھڑون کو اور نمبر ۲۲ بھیسٹھ کو دینا چاہئے اور اون کی خوراک  
 میں خوب نمک ملا کر دیتے ہیں + اگر بہت سے جانوروں کو ایک بارگی یہ بیماری  
 ہو جائے تو بسکو ایک مکان میں بند کر کے اوسکا دروازہ کیسقدر بند کر دین  
 اور مطابق نسخہ نمبر ۷ گندھک جلا کر دھونی دین اگر آدمہ گھنٹہ تک دھونی  
 دی گئی ہو اور اس عرصہ کے بعد کھانسی زیادہ اٹھے تو مکان کا دروازہ  
 کھول دین تاکہ ہوا کی آمد و رفت بخوبی ہو اور پھر اوس دن دھونی دینا موقوف  
 رکھیں +

## فصل ششم میں

### زہر دیا جاتا یا کھانا

زہر کھانے سے جو جانور مرتے ہیں یا تو زہر اتفاق سے خود چارہ کے  
 ساتھ کھا جاتے ہیں یا کوئی شخص بدیتی سے اونکو کھلا دیتا ہے زہر دو قسم کا ہوتا  
 ہے ایک تو وہ جو کہ نباتی ہوتا ہے اور دوسرا معدنی جو کہ کان سے لگتا ہے +  
 ہندوستان میں چار لوگ اکثر جانوروں کو زہر کھلا دیتے ہیں اس مطالبہ سے

کہ اونکی کھال بٹاسے کیونکہ ہندوستان میں یہ قاعدہ ہے کہ مردہ جانور اونکی  
لاش گھسورون یعنی بھاگ پر پھینک دیتے ہیں اور اونکی کھال کے مقدار چار ہوتے ہیں  
بعض ضلعوں میں چار لوگ زمیندارون کو بعض اس حق کے نذرانہ دیتے ہیں +

چار کھال نکال کر چمڑے کے بیوپاریوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں + اکثر جگہ چارون  
اور سوداگر دن میں قول اور اقرار اور کھاڑی ہو جاتی ہے اسمضمون سے کہ  
اتنے عرصہ میں اس قدر کھالیں چار لاونگے اور سوداگر اسکے عوض اس قدر روپیہ  
دینگے بلکہ یہ بھی دستور ہے کہ سوداگر لوگ چارون کو کچھ روپیہ پیشگی دیدیتے ہیں اسوقت  
سے جب چارون کو اس مدت میں کھالیں اور سوداگر نہیں ملتیں، جس قدر اونکو درکار  
ہیں تو وہ جانورون کو زہر کھلا دیتے ہیں یہ لوگ اکثر خود زہر دیتے ہوئے یا اپنی  
جہاز (چگون) کے ہاتھ سے دلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں +

طریقہ زہر دینے کا یہ ہے کہ زہر کو تھوڑے سے گھی یا آٹے میں ملا کر کھلایا اور  
کسی درخت کے پتے میں لپیٹا کر کوئینی کے منہ میں دیتے ہیں یا چارہ کھانے  
کے وقت اوسکے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ چارہ کے ساتھ اوس کو بھی  
کھا جائے +

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چراگاہ میں جہاں کہیں اچھا چارہ دیکھتے ہیں اوس پر  
زہر چھڑک دیتے ہیں +

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ پر تیز نوکدار آکے سے کھال  
کے نیچے چھید کر کے زہر ڈال دیتے ہیں یا گھبرکی راہ یا پیشاب کی راہ میں زہر ڈال  
دیتے ہیں +

زہر جو اکثر استحال میں لاسٹے ہیں وہ ٹھکریا یا ہرنال ہے بعض مرتبہ وہ زہر جو کہ نباتی ہوتا ہے مثل دھتورہ یا میٹھا تیلیہ یا مدار یا کچلا کام میں لاسٹے ہیں سنگا ہے کہ بعض مرتبہ چارون کو سنگھا سوداگر لوگ دیتے ہیں + جب چیچک کی بیماری جانورون میں پھیلی ہو اس وقت چارون کو زہر کھلانے کا خوب موقع ہاتھ لگتا ہے کیونکہ کئی شبہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے جانور کو زہر دیا گیا ہے + چار لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ چیچک کی بیماری اڑ کر لگتا ہے اس واسطے چارون نے ایک دفعہ یہ تدبیر کی کہ ایک مردہ جانور کے معدہ اور انتڑیوں کی لالیش جو کہ چیچک کی بیماری سے مرا تھا دوسری گائے کی چراگاہ میں پھینک دی تھی تاکہ وہاں بھی چیچک کی بیماری پھیل جائے اور کھال ہاتھ لگے لیکن یہ مرتبہ مویشی ریٹڈی کے درخت کے پتے یا بیج کھا لیتے ہیں اور قحط سالی میں زہر ملی گھاس وغیرہ کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں +

جب گائے یا بیل زیادہ زہر کھاتا ہے تو یکایک بیمار ہو جاتا ہے تھمر تھرتا ہے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے جبکہ باعث شدہ اپنے پیٹ میں سینگ یا کچھلے پیرون مارتا ہے اور گردن پھیر کر پیٹ کی طرف بار بار دیکھتا ہے منہ سے جھاگ بہتا ہے پیاس بہت معلوم ہوتی ہے دوسری جاری ہوئے بین خون بھی دست میں آتا ہے اور اکثر دو گھنٹہ سے چار گھنٹہ کے اندر مر جاتا ہے + جلدی یا دیہ میں مرنا مقدار اور قسم زہر پر منحصر ہے +

چونکہ زہر اکثر بہت ماکھلایا جاتا ہے اس واسطے علاج سے کم فائدہ ہوتا ہے اور مالکان مویشیہ کہہ پاس ۱۹۵۶ء راجستھان سے ان زہر کا درجہ بہترین موتی +

تب کسی مالک مویشی کو شبہ ہو کہ اس کے مویشی کو زہر دیا گیا ہے تو چاہئے کہ جانور کے مرنے کے بعد چوتھے سے پندرہ یعنی چبترہ اور انٹریون کے شروع حصہ کی آلائش اور ایک ٹکڑا معدہ کا ایک انٹری کا خصوصاً وہ جو کہ چبترہ سے ملا ہوتا ہے کا ٹکڑا ایک بڑی بوتل میں رکھ کر خوب تیز ہندوستانی شراب اوسمیں بھر دے اور خوب مضبوط ڈاٹ لگا کر امتحان کے لینے بھیج دے + صاحب مجسٹریٹ اور ضلع کے ڈاکٹر صاحب اس کی بخوشی مدد کریں گے کہ کس طرح بوتل امتحان کرنے والے صاحب کے پاس روانہ کریں +

جب جانور کم زہر کھا گیا ہو اور علامتیں بھی کم ہوں تو نسخہ نمبر ۳ فوراً دینا چاہئے اور اسی کا مائڈ کھلاوین جب تک پیٹ کا درد نہ جائے اور دست بند نہ ہو وین تب تک ہرگز پانی نہ دینا چاہئے +

بیمار جانور کو کھانے کے واسطے کھلی کوپکا کر اس کے ساتھ چوکر کی سامی دینا چاہئے اور ایک یا دو روز کے بعد ہری گھاس کھلاوین لیکن سخت گھاس ہرگز نہ دین +

## فصل اٹھارہوین نسخہ جات جلاب مین نمبر

سفوف جا لگوٹا ————— قیہہ ۵۰  
نمک یعنی کھانے کا لٹا یا بسم یعنی دست آئینا نمک ————— مین چٹا نمک



یہ جلاب چاول کے آدھ سیر گرم ہانڈین ملا کر قبض کی حالت میں دین +

### مکمل

سفوف گندھک ————— ایک چھٹانک

السی کا تیل ————— دو چھٹانک

چاول کا گرم ہانڈ ————— آدھ سیر

یہ جلاب ہے + بعد جلاب کے اگر دست جاری کھنا نکلے ہو اس نسخہ کو دینا +

### مکمل

السی کا تیل ————— ایک چھٹانک

سفوف گندھک ————— دو چھٹانک

سفوف سوٹھ ————— سو اٹالہ

یہ جلاب سخت ہے چاول کے آدھ سیر گرم ہانڈین ملا کر پلوین + بیڑے واسے

آدھ وزن ان دواؤں کا کافی ہے +

### مکمل

تک ————— چھ چھٹانک

سفوف گندھک ————— سو اٹالہ

سفوف گندھک ————— پانچ ٹولہ

سفوف سوٹھ ————— اڑھائی ٹولہ

سفوف گندھک ————— دو چھٹانک

سفوف گندھک ————— ایک سیر

اس جلاب کا بھیڑ کے واسطے چٹھا حصہ کافی ہو گا +



اپس سالٹ یعنی ست آئینکا نمک یا کھانیکا نمک ----- دو چٹھانمک

سفوف گندھک ----- ڈیڑھ چٹھانمک

سفوف سونٹھ ----- سوا تولہ

راب ----- ڈیڑھ چٹھانمک

یہ ملائم جلاب ہے + سب دواؤں کو دوسیر گرم پانی میں ملا کر اور ٹھنڈا کر کے پلاوین +



اپس سالٹ یا نمک ----- چھ چٹھانمک

سفوف سونٹھ ----- پانچ چٹھانمک

سفوف گندھک ----- دو چٹھانمک

سفوف سونٹھ ----- پانچ چٹھانمک

ہندوستانی شراب ----- ایک چٹھانمک

یہ نیز جلاب ہے + دوسیر گرم پانی میں سب دواؤں کو ملا کر گٹھنا پلاوین بھیجے +

کے واسطے آدھا کافی ہے اور بھیڑ کے واسطے چٹھا حصہ +

تسخیرات دافع بنجار



کاغذ ماشہ

شورہ ————— ایک تولہ  
ہندوستانی شراب ————— آدھی چھٹانک  
پہلے کا فور کو شراب میں ملاوین بعد اسکے شورہ کو ڈالیں اور ایک سیر ٹھنڈے  
پانی میں ملا کر پلاوین +



شورہ ————— سو اتولہ  
نک ————— ارٹھائی تولہ  
سفوف چلایتہ ————— ارٹھائی تولہ  
راب ————— ڈیڑھ چھٹانک  
ان سب چیزوں کو آدھ سیر پانی میں ملا کر پلاوین +



کچا فور ————— نو ماشہ  
شہدہ ————— نو ماشہ  
سفوف بیخ دہتورہ ————— ساڑھے چار ماشہ  
ہندوستانی شراب ————— آدھی چھٹانک  
پہلے کا فور کو شراب میں ملاوین بعد اسکے شورہ کو ڈالیں اور آدھ سیر پانی  
میں ملا کر پلاوین +

# نسخہ جات دوا واسطے لاسطاعت کے

## نمبر ۱۰

نمک ————— تین چھٹانک  
سفوف سوئمہ ————— دو چھٹانک  
سفوف کرڑو ————— ایک چھٹانک  
جب جانور کو بخوک نہ لگے آدھی چھٹانک ہر ایک کھانیکے ساتھ مویشی کو کھلاوین +

## نمبر ۱۱

سفوف ترمہ ————— ایک چھٹانک  
سفوف سونف ————— دو چھٹانک  
نمک ————— دو چھٹانک

جب مویشی کو بخوک نہ لگے چارم حصہ اس نسخہ کا ایک خوراک دے۔

## نمبر ۱۲

سفوف سوئمہ ————— سوا تولہ  
سفوف پرایتہ ————— سوا قلم  
سفوف کالی مرچ ————— سوا قلم  
سفوف اجوائن ————— سوا تولہ  
نمک ————— ایک چھٹانک

سب دوائوں کو خوب ملا کر چارم حصہ راب اور گرم پانی میں ملا کر پلاوین +

## تکبیر ۱۱

سفوف کھریاٹی ————— ایک چٹانک  
 سفوف کتھہ ————— آدھی چٹانک  
 سفوف سوٹھہ ————— سوا تولہ  
 افیون ————— ساڑھے چار ماشہ  
 ہندوستانی شرب ————— ایک چٹانک  
 پانی ————— ڈیڑھ پاؤ  
 سب کو خوب ملا کر بھٹیر کو ایک سے دو چٹانک تک صبح و شام دین اور بچھر و نکو  
 اس سے دو چند پلاوین \*

## تکبیر ۱۲

ہندوستانی شرب ————— آدھی پاؤ  
 سفوف سوٹھہ ————— ایک چٹانک  
 سفوف کتھہ ————— سوا تولہ  
 ان سب کو آدھ سیر گرم پانی میں ملا کر جو ان مویشی کو پلاوین اور بچھر سے کو  
 آدھا کافئی ہوگا \*

## تکبیر ۱۵

نمک ————— چھ ماشہ  
 سفوف ہیرا کسب ————— ڈیڑھ ماشہ  
 پسیکا اور ملا کر روز مرتد ایک تہہ بھٹیر کو کھلا دین \*

سفوف ہیرا کیس ————— ساڑھے چار ماشہ  
سفوف پراپتہ ————— سو اتولہ

یہ بہت اچھی طاقت والا ہوا لی: واسطے آدھ سیر چاول کچھ کچھ مین ملا کر دین +  
 (میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کھانسی کا نسخہ بھی لکھا ہے)

تو اس کے ————— سو اتولہ

یہ نسخہ اس کے لئے ہے کہ اس کے کھانسی کو روک دے +  
 (میں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک کھانسی کا نسخہ بھی لکھا ہے)

نہایت

پینگ ————— سو اتولہ  
سفوف گنہک ————— ایک چٹناک

آدھ سیر گرم پانی مین ملا کر پانچ چھوٹے برابر دیا جائے +

نہایت

تو اس کے ————— سو اتولہ

سفوف ہیرا کیس ————— سو اتولہ

سفوف گنہک ————— سو اتولہ

تین چار روز تک ایک یا دو دفعہ دن میں دیا جائے +

### نمبر ۲۰

تیل نارین ————— ایک چمٹا تک

تیل السی ————— تین چمٹا تک

ایک سیر گرم پین ملا کر پلاوین دوسرے تیسرے دن اسطرح دیتے رہیں +

### نمبر ۲۱

نمک ————— چھ ماشہ

سفوف ہیرا کیس ————— ڈیڑھ دانہ

اسکا سفوف ملا کر روز مرہ بھیر کو دین +

### نمبر ۲۲

تیل السی ————— ایک چمٹا تک

تیل نارین ————— پانچ چمٹا تک

ملا کر واسطے دین کر سٹے کثیر دن کے بھیر کو پلاوین +

## نسخہ جات ادویہ قابلہض

### نمبر ۲۳

سفوف نیلا شہو تھاب ————— ساڑھے چار ماشہ سے نو ماشہ تک

پانی آدھ سیر ملا کر مویشی کو پچش کی بیماری میں جو کہ بہت روز سٹے ہو دیا

## مذہب ۲۳

سفوف کھریاٹھی ————— پوسنے چار تولہ <sup>۳۰</sup>

پاس کا گوند ————— پون <sup>۳۱</sup> تولہ

افیون ————— ساڑھے چار ماشہ

سفوف چرایتہ ————— سوا تولہ <sup>۳۲</sup>

سب کو اچھی طرح پیکر ایک پٹنا تک ہندوستانی شراب میں ملا دین اور ایک سیر

چاول کے مانند میں ڈال کر واسطے بند کرنے دستوں کے پلاوین +

## مذہب ۲۴

سفیدہ ————— ڈیڑھ ماشہ

سفوف کھریاٹھی ————— اڑھائی تولہ

افیون ————— پون تولہ

خوب گاڑھے مانند میں ملا کر دو مرتبہ دن میں واسطے دور کرنے مرض بچیش کے

کھلاوین +

## مذہب ۲۵

سفوف نیلا تھوٹھا ————— ڈیڑھ ماشہ سے تین ماشہ تک

پانی ————— ایک پاؤ

ملا کر بھیکو دین +



## نمبر ۲۷

سفوف کھریاٹی ————— ایک چٹناک  
 سفوف کتھا ————— اڑھائی تولہ  
 سفوف سوختہ ————— سوا تولہ  
 افیون ————— ساڑھے چار ماشہ  
 ہندوستانی شراب ————— ایک چٹناک  
 پانی ————— ڈیڑھ پاؤ  
 خوب ملا کر بھتر کو بھیج و شام ایک یادو چٹناک کھلاوین اور بھترے کو اس سے  
 دو چند پلاوین \*

## نمبر ۲۸

سفوف کھریاٹی ————— سوا تولہ  
 افیون ————— ڈیڑھ ماشہ  
 سفوف سوختہ ————— نو ماشہ  
 سبکو ملا کر دودھ یا السی کے ماڈ میں بھترے کو پیش کے مرض میں دین اور بھتر  
 کے بچہ کو تیسرا حصہ دینا چاہیے \*

## نمبر ۲۹

سفوف افیون ————— ایک کائی  
 سفوف کھریاٹی ————— ساڑھے چار ماشہ  
 سفوف کٹرو ————— ساڑھے چار ماشہ

سفوف سوختہ سارے عایا

بجھیر کو جبکہ دست ہوتے ہوں اسی کے گرم پانی میں ملا کر دینا چاہئے +

کتاب

## اگاسنے کی دوائیں

سفوف کھرباٹی دو پیشانی

سفوف کونلا اڑھائی ٹولہ

سفوف پتنگری در آبلہ

سفوف نیلا تھو تھا سواتور

ان بکولاکر پیس ڈالیں اور گھاؤ پر چھڑک دیں +

کتاب

## طوطیا کا مرہم

نیلا تھو تھا سارے چار اشہ

تیل ٹارپن سارے چار اشہ

تیل اسی وہ چھٹا تک

موم آدھ باؤ

موم کو تیل میں گھلا کر تیل ٹارپن اور نیلا تھو تھا ملاوین جب تک ٹھنڈا نہ ہو جاوے +

یہ مرہم خراب زخموں پر لگایا جاتا ہے +



آدھ سیر

پانی

بہر پانی زخم کو اچھا کرتا ہے

پھٹکری کا پانی نمبر ۲

نواشہ

پھٹکری

دو چٹنا تک

راب

آدھ سیر

پانی

گھول کر پلاوین +

نسیجات خون صاف کرنیوالی دواؤں کے  
نمبر ۳۳۶

سوا تولہ

مصیر

پون تولہ

سفوف ہیرا کیس

سوا تولہ

سفوف سونٹھ

سبکو سفوف کر کے ڈیزہ چٹنا تک راب و آدھ سیر گرم دیتلے مانڈمین ملا کر دوسرے

تیسرے دن پلایا کرین +

نمبر ۳۳۷

اڑھائی تولہ

سفوف گندک

پون تولہ

سفوف شورہ

سفوف سوختہ ..... اڑھائی تولہ

ایک یاد و دفعہ دن میں مانڈ کے ساتھ ملا کر دینا چاہئے +

نمبر ۱۵

نمک ..... اڑھائی تولہ

سوزف گندک ..... اڑھائی تولہ

موشی سکے واسطے عطر دواسے جو پیر اور پچیس ..... واسطے آدنوار تھہ مانڈین

دینا چاہئے +

نسیجات ادویہ مقوی

نمبر ۱۶

تیل نارپین ..... ڈیڑھ چھٹانک

تیل السی ..... ڈیڑھ چھٹانک

گرم مانڈ ..... ایک پاؤ

یہ دوا بہت فائدہ مند ہے +

نمبر ۱۷

نوسادر ..... نو اشے سے ایک تولہ تک

پانی ..... ایک پاؤ

یہ بھی بڑی مفید ہے +

## مکملہ ۱۴

ہندوستانی شراب ————— دو چھٹانک سے تین چھٹانک تک

سفوف سوٹھ ————— سوا تولہ

سفوف کالی مرچ ————— سوا تولہ

راب ————— ڈیڑھ چھٹانک

ملا کر آدھ سیر گرم پانی میں دین +

## مکملہ ۱۵

سفوف تمباکونشک ————— سوا تولہ

راب ————— دو چھٹانک

گرم پانی ————— ڈیڑھ پاؤ

ملا کر دین +

## مکملہ ۱۶

دہتورہ کی بیج کا سفوف ————— ساڑھے چار ماشہ

کافور ————— نو ماشہ

ہندوستانی شراب ————— دو چھٹانک

کافور کو شراب میں ملا کر دہتورہ کو ملاوین اور ایک سیر گرم مائڈ میں پلاوین +

## مکملہ ۱۷

تیل ٹائپین ————— نو ماشے سے ایک تولہ تک

کرو اتیل ————— آدھ پاؤ

خوب ملا کر چاول کے گرم اندھین ملاوین  
 نمبر ۴۵

تیل السی ————— ایک پاء

افیون ————— ایک ٹولہ ڈیڑھ ماشہ

ایک سیر گرم اندھین ملا کر ملاوین +

خارش کا مرہم  
 نمبر ۴۶

تار کا تیل  
 تیل ٹارپین  
 کرٹوا تیل  
 ہمزون

گندھک کا سفوف آنا ملاوین کہ وہ مرہم سا ہو جاوے + مرہم خوب رگڑ کر دوسرے  
 روز دو تین مرتبہ دن میں مالش کریں +

نمبر ۴۷

کرٹوا تیل ————— ایک سیر

شنگرف ————— پاؤ تولہ

تیل کواگ پر گرم کر کے اور شنگرف کو خوب سفوف کر کے ملاوین اور گرم ہی  
 لگاوین +

زخمون کا پکھا ہا  
مکتبہ ۸۴

واسطے ٹوٹے ہوئے سینک کے

موٹے کپڑے پر نار کو پکھا کر ٹوٹے سینک پر لگا دین

مکتبہ ۴۹

کافور ————— ایک حصہ

تیل نارپین ————— پاؤ حصہ

میٹھا تیل ————— چار حصہ

خوب ملا کر زخموں پر لگا دین اور جو انگور اوپنچا ہو گیا ہو نیلا تھوٹھے کا سفوف لگانا چاہئے

مویشی اور بھیڑ کے پانوں کے زخم کے واسطے بہت مفید ہے +

مکتبہ ۵۰

کڑوا تیل —————

تیل نارپین —————

ملا کر لہین +

آبلہ اور ٹھانی کی دوائیں

مکتبہ ۵۱

تیلیا کمی ————— ایک حصہ

السی کا تیل ————— چھ حصہ

موم ————— چھ حصہ



موسم پھلزار تیل میں ملا دین اور بعد اسکے کھینچ کر سفوف کر کے ڈال دین :-

### نمبر ۵۲

تیل جا لگو :- پاؤ چھٹانک

کر ڈو اتیل :- آدھ پاؤ

نوب ملا کر لگا دین +

### نمبر ۵۳

راحی کا سفوف :- ڈیڑھ چھٹانک

تیل مار پین :- پاؤ چھٹانک

کر ڈو اتیل گرم کیا ہوا :- پاؤ سیر

خوب ملا کر لگا دین +

### نمبر ۵۴

### چونین اور کلنیون کی دوا

یٹھاتیل :- ایک سیر

سفوف گندہک :- ڈیڑھ چھٹانک

مار کا تیل :- آدھی چھٹانک

تیل مار پین :- پاؤ چھٹانک

سب کو ملا کر چونین اور کلنیون کے مقام پر لگا دین :-

## سینک کر نی دوا

مذہب ۵۵

گمیل یا غلائل گرم پانی میں ڈبو کر اور پچوڑ کر پاؤ گھٹے سے آدھے گھنٹہ تک سینکین  
اگر احتیاط رہے کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جاوے بعد سینکے کے خشک کپڑے سے  
پونچھیں اور اس نسخہ کو ملین +

کرٹا تیل \_\_\_\_\_ چار حصہ  
تیل ٹارپین \_\_\_\_\_ دو حصہ

## دھونی کی دوا

مذہب ۵۶

تھان کی جگہ گندھک کو کرچھے یا کسی لوسہ کے برتن پر رکھ کر آگ پر جلاوین  
اور دروازہ کو کسی قدر بند کر دیں جب تک جانور کھانسنے لگے +

مذہب ۵۷

ایک جانور کے دھونی دینے کے واسطے پہلے ترکیب ہے گندھک یا  
ہار کو کسی لوسہ کے برتن میں رکھ کر تیل یا گاسے کے سامنے آگ پر رکھیں  
تا کہ دھواں اوسکا مانس لینے کی راہ پیپٹھڑے میں جاوے مگر یہہ خیال  
رکھنا چاہئے کہ دھنویں کے ساتھ ہوا بھی پیپٹھڑے میں جاتی رہے ورنہ  
جانور کے مرجائنے کا اندیشہ ہے +

## پلٹس نمبر ۵۸

پھو کر بقدر ضرورت گرم پانی مین ملا کر بیسی کی طرح بناوین اور کپڑے پر  
بچھا کر میٹھا تیل ڈال کر زخم پر لگاوین اگر زخم خراب ہو تو سفوف کو سٹکے کا پلٹس  
چھٹک کر زخم پر لگاوین اور بار بار بدلتے رہین +

## نمبر ۵۹ مانڈ

السی کا مانڈ

السی ————— ڈیڑھ پاؤ

پانی ————— چار سیر

خوب جوش دیکر آہستہ آہستہ ہلاتے رہین ایک گھنٹہ تک اس کے بعد کپڑے  
مین چھان لین اور ٹھنڈا ہونے پر نمک ملا کر دین +

## نمبر ۶۰

چاول کا مانڈ

چاول ————— تین پاؤ

پانی ————— پانچ سیر

ڈیڑھ گھنٹہ تک جوش دین اور پھر کپڑے مین رکھ کر چھان لین اور ٹھنڈا  
ہونے پر نمک ملا کر دین +

## طریقہ نہانے اور دینے پچکاری کا

ایک فٹ لمبا اور آدھ انچ موٹا بانس لیکر اوسکے سر وں کو تراش کر گول کر دین بعد اوسکے ایکسچڑے کی تھیلی حسین ڈیڑھ سیر پانی آوے یا ایسی کہ ڈیڑھ فٹ لمبی اور چار یا پنج انچ چوڑی ہو لیکر اوسکے نیچے کے سر سے پر ایسا سوارخ کریں کہ بانس کا سر اس میں جا جاوے بعد اوسکے خوب مضبوط باند بین تاکہ پانی نہ نکلے پاوے ۴ بوقت دینے پچکاری کے بانس پر تیل لگا کر جانور کی دم کے نیچے ڈالیں اور ایک ہاتھ سے تھامتے رہیں اور دوسرے ہاتھ سے تھیلی کا کھٹکا دھامند پکڑ کر جانور کی پیٹھ سے اونچا اٹھاویں اور کسی دوسرے آدمی سے کہیں کہ وہ دوا اوتی تھیلی کے اندر ڈالے اس ترکیب سے دوا آسانی سے آنتوں میں چلی جائیگی ۴

۴ دوسرے گرم پانی میں تھوڑا سا بون اور ایک باڈیڑھ چھٹا کھمبہ لکڑی تیل یا ز سب ترکیب نسخہ نمبر ۹۱ سے کریں ۴

نمک ————— آدھی چٹانک سے ایک چٹانک تک۔  
تیل ٹارپین ————— آدھی چٹانک

خوب ملاوین اور مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۴۴ وال دین +

نمبر ۴۴

## پچکاری دست و کنے کی

چاول کا مائٹ ————— ایک سیر  
افیون ————— پون تولہ

خوب ملا کر حسب ترکیب اوپر لکھی ہوئی سنے کریں +

نمبر ۴۵

## کپڑے دفع کرنیکی پچکاری

یٹھا تیل ————— آدھ سیر  
تیل ٹارپین ————— آدھی چٹانک

ملاوین اور گرم کر کے دویم کے نیچے یعنی متعدد کی راہ دین +

نمبر ۴۶

## ترکیب چھیدنے کی

جس مقام پر سوا چھیدنا منظور ہو وہاں پر پون انچھ کے موافق تیز پھرنی سے

چیمین اور اوسے کے مقابل دو یا تین انچھ کے فاصلے پر دوسرا شگاف کریں اور سوئی کے ناکے میں رسی یا گھوڑے کے بالوں چوٹی سے گوندھ کر پرو دین اور ایک شگاف کی طرف سے داخل کر کے دوسرے شگاف کی طرف سے نکالیں اور اوسکے دونوں سرے ملا کر جڑے سے کچھ فاصلہ پر گرہ لگا دین اور اوسکے اوپر تیل کا فوراً مینر مطابق نسخہ نمبر ۴۴ کے لگا دین تاکہ کبھی نہ بیٹھنے پاوے +

اور جب کہ منہ پر لگانا منظور ہو تو اوسکی ترکیب بہت سہل ہے بغیر شگاف کئے سوئی کو منہ ڈورا ایک طرف سے جمبہ گرد دوسری طرف کو نکال لیں +

## ترکیب دوا پلاسنے کی

چاہئے کہ ایک درگاہریل کے بائیں طرف کھڑا ہو کر اوسکے سر کو اوپر اٹھاو اور دوا پلاسنے والا داہنی طرف کھڑا ہو کر ہیل کے منہ کے داہنے کوٹے میں بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ڈال کر اوس طرف کے گال اور ہونٹ کو باہر کھینچے بعد اوسکے دوا کی بوتل کو داہنے ہاتھ میں لیکر تھوڑا تھوڑا پلاو دین تاکہ وقت تک سب پی جاوے + خصوصاً اون جانورون میں کہ جبکہ منگے میں بیماری ہے ہے بہت سی اکٹھی دوا نہ ڈالیں اور جہاں فورکھا نیسے یا ارادہ کھا نیسے کا کرے اوسکا برھوڑ دین تاکہ وہ اپنا سر نیچا کر کے کھانسے ورنہ سانس لینے کی نالی میں دوا چلے جائے گا اندیشہ ہے اور جانور کے مرجانے کا

نڈر ہے + دو اپلاسنے کے واسطے دھات کی بوتل بشکل عام بوتلوں کے  
 ہونی چاہئے اگر نہ ملے تو عام بوتل سے کام نکال لینا گرا احتیاط رہے  
 کہ دانت کے نیچے آکر ٹوٹنے نہ پاوے +

دستخط ہے - ایچ - بی - ہیلن  
 انسپیکٹنگ ڈیپارٹمنٹ سرجن  
 فوج اعظم بمبئی -

کلمتہ  
 تاریخ - نوبر ۱۹۱۷ء

س م ج





ع۲۲۸

۶۱۹

This book was taken from the Library  
on the date last stamped. A fine of  
1 anna will be charged for each day  
the book is kept over time.

---

--	--	--	--

